

## 2. 高原岩鹨 *Prunella himalayana* (Blyth)

英文名: Himalayan Accentor.

*Accentor himalayanus* Blyth, 1842, Journ. As. Soc. Bengal 11:187(模式产地:喜马拉雅山脉地区).

*Accentor altaicus* Brandt, 1843, Bull. Acad. Imp. Sci. St. Petersb. 1:365(模式产地:阿尔泰山脉).

**鉴别特征** 体形比麻雀稍大, 胸是棕色, 但具白色羽缘。




图 133 高原岩鹨 *Prunella himalayana* 的分布图

**形态** (据采自新疆库尔干标本)

成鸟: 前额、头顶和后头灰褐, 具较暗的羽轴纹; 背、肩和内侧次级飞羽黑色, 有宽的棕色羽缘, 后者有白尖; 腰和中央尾羽淡灰褐, 具乌暗条纹; 外侧尾上覆羽黑色具淡棕色羽缘; 外侧尾羽暗褐, 尖端和羽缘淡棕; 翅上覆羽淡黑, 具棕色羽缘和淡白尖端; 初级飞羽和外侧次级飞羽褐色, 有淡棕色狭窄羽缘; 眉纹细而淡灰色, 眼下羽毛淡黑, 具白色点斑; 耳羽棕色, 羽轴较淡; 颊、喉和上颈白色, 胸部有一模糊的黑色带斑延伸至两侧, 向下其全羽毛棕色具白羽缘, 胸部少量羽毛有一狭窄的黑色羽缘; 腹部中央和肛羽几乎白色, 尾下覆羽黑色具宽的白羽缘。

虹膜砖红色; 嘴黑色; 跗蹠、趾暗褐、爪黑色。

**量衡度:**

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	32	144	11	88.5	48	32

**地理分布** 国内分布于新疆西部喀什、天山、中部和靖、乌鲁木齐及北部阿勒泰(夏候鸟)。国外分布于巴基斯坦, 印度北部, 尼泊尔, 锡金。