

3. 鹁岩鹟 *Prunella rubeculoides* (Moore)

英文名: Robin Hodgson Sparrow.

Accentor rubeculoides Moore (ex Hodgson MS), 1854, Cat. Birds Mus. East India Co. 1, p. 361
(模式产地: 尼泊尔).

Prunella rubeculoides muraria R. et A. Meimertzhagen, 1926, Bull. Brit. Orn. Club. 46, p. 99
(模式产地: 印度克什米尔西北部).

Prunella rubeculoides fusca Mayr, 1927, Orn. Monatsb. 35, p. 148 (模式产地: 四川巴塘).

Prunella rubeculoides beicki Mayr, 1927, Orn. Monatsb. 35, p. 149 (模式产地: 甘肃北部).

鉴别特征 与棕胸岩鹟区别于头部和胸完全淡褐灰色, 无眉纹。

形态 (据采自四川石渠标本)

成鸟: 前额、头顶、颈项和头侧暗褐色; 背、肩和腰黑色而具棕褐羽缘; 尾上覆羽橄榄褐色; 尾羽暗褐具较淡的羽缘; 小覆羽、中覆羽灰褐, 具白色端缘, 大覆羽暗黑, 具带棕色羽缘和棕白色端缘; 飞羽暗黑具较淡的边缘, 内侧次级飞羽具淡棕色的宽羽缘; 颏、喉、前颈灰褐; 胸锈赤褐色, 下胸、腹和胁部暗黑, 具淡的暗黄或几乎白色的羽缘; 肛羽两侧和尾下覆羽棕黄色。

虹膜淡褐色; 嘴黑色; 跗蹠和趾肉褐, 关节处黑褐色, 爪暗黑。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (19)	21.3 (15—35)	153.6 (133—173)	12.1 (10.5—13)	77.6 (71—84)	69.5 (63—75)	24.1 (22.1—26)
♀♀ (16)	22.1 (15—25)	144.9 (135—160)	11.3 (10—12)	75.2 (73—81)	65.8 (60—71)	23.8 (22—25)

地理分布 国内分布于青海东北部、东部及南部玉树, 甘肃西北部天堂寺、西南部及




图 134 鹁岩鹟 *Prunella rubeculoides*

东南部, 四川西部康定至巴塘, 西藏南部、西部阿里、昌都地区北部和西南部 (留鸟)。国外分布于印度北部, 巴基斯坦, 尼泊尔, 锡金。




图 135 鹁岩鹟 *Prunella rubeculoides* 的分布图

生态 (录自西藏鸟类志) 夏季多见单个或成对生活高山灌丛或草坡、土坎、河滩的低金腊梅灌丛地方。春季有集群现象。1977年7月在错那(3300m)地方采到一只雄鸟, 生殖腺相当膨大(15mm×10mm), 门士一只(15mm×8mm)。1976年7月3日在噶尔县门士4600m的锦鸡儿灌丛中得一巢, 巢中有雏鸟3只, 重量分别为17、16和15g, 尚有一未孵出的卵, 卵纯天蓝色。雏鸟已能看出雌雄的区别, 2只为雄性, 除眼周、腰侧、颏、喉侧及胸侧并扩至肩部, 腹侧和腹中央裸露外, 其余部位均被稚羽。巢的量度: 巢高4.0cm、深3.0cm, 外径12.0cm×10.0cm, 内径7.0cm×8.0cm, 外层材料为沙鸡羽毛, 干草, 主要为地衣, 内层几全为羊毛。

胃检为鳞翅目、鞘翅目昆虫和草子、青稞、油菜子及沙粒。