

7. 黑喉岩鹀 *Prunella atrogularis* (Brandt)

英文名: Black-throated Accentor.

Accentor atrogularis Brandt, 1843, Bull. Phys. Acad. Imp. Sci. St. Pétersb., 2: 140 (模式产地: 巴勒斯坦 Semi-Palatime).

鉴别特征 与褐岩鹀很相似, 但黑喉是其很大区别。上体背部暗褐色条纹显著; 耳羽暗褐; 眉纹牛皮黄; 翅上具两个淡白翅横斑; 喉黑褐; 喉侧、胸和胁部浓牛皮黄, 胁有暗褐条纹; 腹部中央奶黄。

形态 (据指名亚种标本)

成鸟: 眼先、耳羽、头侧、颞和胸黑色, 具很狭窄的继续的牛皮黄条纹; 前额、头顶暗褐, 两侧较暗; 牛皮黄色眉纹较宽, 而眉纹羽轴纹色较深; 背和肩羽棕褐; 颈项灰色, 具宽的褐色羽轴纹; 腰和尾上覆羽褐色; 尾羽褐色具较淡的狭窄羽缘; 胸和颈侧、胁部赭浅黄, 羽基黑色, 胁羽具褐色条纹; 腹、肛羽、尾下覆羽白色, 后者具暗褐宽条纹。翅淡褐黑, 外翮棕茶黄色; 中覆羽、大覆羽在外翮具不明显的深褐色羽轴纹。

虹膜暗褐; 嘴暗黄褐; 嘴基肉色, 跗蹠和趾角褐, 爪暗黑。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	22	152	11	71	65	23

亚种分化 本种分化有 2 个亚种, 国内仅分布 1 个亚种。

(1) 指名亚种 *Prunella atrogularis atrogularis* (Brandt)

Accentor atrogularis (sic) Brandt, 1844, Bull. Phys. Acad. Imp. Soc. St. Petersburg, Col. 140
(模式产地: 巴勒斯坦 Semipalatinsk).

形态及量衡度详见种的描述。




图 141 黑喉岩鹀 *Prunella atrogularis* 的分布图

国内分布于新疆西部喀什、天山、中部乌鲁木齐和博格多山、北部准噶尔的乌仑古; 西藏 3600m 以上的山地 (夏候鸟)。国外分布于俄罗斯乌拉尔和伊朗。