

13. 黑喉织布鸟 *Ploceus benghalensis* (Linnaeus) (图版 I : 图 3)

英文名: Black-throated Weaver Bird.

地理分布 国内分布于云南西双版纳的勐海和勐腊。国外见于印度, 巴基斯坦, 孟加拉国及英国。




图 20 黑喉织布鸟 *Ploceus benghalensis* ●分布图

鉴别特征 体形似麻雀。繁殖期雄鸟冠部黄色; 上体暗褐; 胸部黑色, 下体余部茶黄色, 胸后和胁部具褐色条纹。雌鸟和雄鸟冬羽为冠部暗褐色, 与上体相似, 颈侧具鲜黄色块斑。

形态 雄性成鸟(夏羽): 额与冠部为辉金黄色, 被一条从眼睛绕过后颈的黑线环绕; 背和肩羽暗褐, 边缘色较淡; 腰和尾上覆羽淡褐色; 尾羽褐色; 翼羽暗褐, 边缘茶黄色; 头侧和眼先褐色; 颊和喉苍白; 胸部黑色, 下体余部为暗淡的茶黄色, 并在胸后和胁部具有褐色条纹。

雄性成鸟(冬羽): 额与冠部暗褐, 羽缘苍淡; 眉纹金黄色; 上体和翅羽暗褐, 具有宽的茶黄—棕色边缘; 髯纹暗褐, 其上具一黄色块斑; 眼上具一淡黄色块斑; 颈侧则具一鲜黄色块斑; 颊和喉淡黄色; 胸羽暗茶黄色, 羽基黑色, 并且这些羽毛的茶黄色不久会消失, 因此到 1 或 2 月间胸部几乎为黑色。

雌性成鸟: 与雄性成鸟冬羽相似, 但黄色部分和胸部的黑色均显淡。

幼鸟: 下体有较明显的条纹, 头部少黄色。

虹膜淡褐色; 嘴珍珠白或淡蓝石板色; 脚淡肉色或带黄肉色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (3)	20,—,—,	125,127,140	14.3,15.8,16	63,63,65	43.6,45,46	19,20,20
♀ (1)	17	120	15	64	44.5	20

分类讨论 中国织布鸟属 2 种中的其中一种, 郑作新 (1964, 1976) 录为纹胸织布鸟 (*P. manyar*), 并打了 "?", 同时注明 "据 Rothschild, 英国伦敦博物馆未见有采自云南的标本"。彭燕章等 (1979) 报道于 1960 年 1 月和 3 月, 分别在云南西双版纳的勐海和勐腊采到 4 号织布鸟标本 (3 ♂, 1 ♀), 当时可能被误认是 *P. manyar*, 后经仔细研究, 雄鸟冬羽颈侧有鲜黄色块斑, 胸部无宽阔黑色条纹, 以此很好与 *P. manyar* 和 *P. philippinus* 相区别, 故改定为黑喉织布鸟 *P. benghalensis*。

生态 黑喉织布鸟在我国分布范围狭窄, 不常见。据 50 年代以来在云南数次考察, 仅于 1960 年 1 月及 3 月在西双版纳勐腊 (海拔 640m) 的勐龙坝和勐捧坝获得 4 号标本。生活于开阔的稻田, 或见于田边飞机草丛中, 营社群生活, 最大群可达几百只。胃内食物有稻谷等。

Loxia benghalensis (Linnaeus), 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 305 (模式产地: 孟加拉国).