

8. 丝光椋鸟 *Sturnus sericeus* Gmelin

别名：牛屎八哥、丝毛椋鸟。

英文名：Silky Starling.

Sturnus sericeus Gmelin, 1788, Syst. Nat., ed 13, 1: 805 (模式产地：中国).




图55 丝光椋鸟 *Sturnus sericeus*

鉴别特征 体形比灰背椋鸟稍大。头顶丝光白色（♂）或污灰色（♀）；背部灰色（♂）或灰棕色。

形态 （据采自陕西标本）

雄鸟：头顶和后颈棕白色，各羽呈披散的矛状；头羽狭窄而长，披至上颈；自后颈至上胸，形成一个不明显的暗灰环；背、腰和尾上覆羽灰色；初级飞羽黑褐，外缘以黄褐色的阔边；次级飞羽为金属绿黑色，外侧基部外缘具一黄褐色块斑，内侧先端有棕白点；尾羽黑，外侧尾羽外翈棕白。颈、喉和腹白色；下胸灰色；腋羽和翅下覆羽白色；尾下覆羽白色。

雌鸟：头顶浅褐色，较雄鸟暗；自背至尾上覆羽灰褐色变淡；颈、喉较雄鸟暗；下体与雄鸟相似为淡灰棕色；翅似雄鸟但无金属光泽。




图56 丝光椋鸟 *Sturnus sericeus* 的分布图

虹膜黑色；嘴朱红色，尖端黑色；跗蹠和趾橘黄，爪黑褐色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♂ (10)	77.6 (68—88)	207 (188—221)	23.6 (22—25)	120.3 (116—124)	69.2 (60—73)	31.9 (31—34)
♀ ♀ (10)	78 (68—84)	204 (184—219)	23.2 (20—26.5)	117.3 (111—124)	66.6 (60—72)	31 (30—33.5)

生态 栖息于开阔平原、农耕区和丛林间，多成对或结成小群活动。从树丛飞出，到草坡、稻田觅食，不甚畏人。鸣声清脆、嘹亮。

据郑作新等（1973），在陕西洋县对29个鸟胃分析，昆虫占取食的比例最大，计有蝽象（6次）、蜻蜓（3次）、豆象、金龟岬、步行虫、叩头虫、蚂蚁、蜂及蛹、鳞翅目幼虫及蛹、蛾类等，植物性食物主要有野生果实和杂草种子等。营巢于墙洞或树洞中，以干草、鸡毛等做巢。

地理分布 国内分布于华南，自陕西南部，河南和安徽南部，江苏至广东和海南岛，西至四川，云南。国外无分布，为我国特有种。