

#### 4. 北椋鸟 *Sturnus sturninus* (Pallas)

别名：燕八哥、小椋鸟。

英文名：Daurian Starling.

*Gracula sturninus* Pallas, 1776, Reise Versch. Prov. Russ. Reich. 3: 695 (模式产地：西伯利亚达  
乌尔地区)。

**鉴别特征** 头顶暗灰色；肩紫黑色，具棕白羽端；体羽有紫黑色金属闪光；尾黑色，  
呈叉状。

**形态** (据采自河北标本)

雄性成鸟：头顶至背暗灰色；枕有紫黑色块斑；背、腰和内侧肩羽及翅上小覆羽为  
金属紫色；外侧肩羽具棕白端；中覆羽棕白；大覆羽和初级覆羽黑色闪绿色光泽；初级  
飞羽黑褐色，具黄褐色羽缘；次级飞羽呈金属绿黑色，外侧基部外缘有黑褐色块斑；尾  
上覆羽棕白；尾羽黑色，闪绿色光泽，外侧尾羽外翮棕白。眼先及眼周白色；头侧及下体  
自喉、胸以下灰白色，胸、胁色较浅淡。

雌鸟：头顶淡褐带灰；上体为土褐灰色；两翅无金属辉亮；下体为棕白色。

虹膜褐色；嘴角黑色；跗蹠和趾角褐色，爪黑色。

**量衡度：**

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (10)	40—62	162—178	13—16	102—110	52—56	25—26
♀♀ (6)	48—58	172—180	15—17	102—103	50—57	24—26

**生态** 栖息平原地区或500—800m海拔的田野，常结群在地面上取食，有时停息在  
路旁树上，也在树上、灌木丛中寻食。繁殖期间成对或单独活动，营巢在树洞和墙缝中，  
巢材由禾本科草叶及树叶等筑成浅盘状巢，内铺以细草和少量羽毛。每窝产卵4—6枚，卵  
为天蓝色。卵的大小为22.4mm×17.5mm和22.8mm×17.3mm。

主要以昆虫为食，为蝗虫、地老虎、尺蠖、蜡象、舟蛾等农林害虫，偶食野果和杂  
草种子。为农林益鸟。

**地理分布** 国内分布于内蒙古，吉林，黑龙江和辽宁各地，河北，陕西，山西，宁  
夏，甘肃，河南，山东，安徽，湖北，江苏，四川，云南东南部，广东和海南岛。国外分  
布于欧洲东部地区，蒙古，朝鲜和东南亚各地。




图49 北椋鸟 *Sturnus sturninus* 的分布图