

13. 家八哥 *Acridotheres tristis* (Linnaeus)

英文名: House Myna.




图62 家八哥 *Acridotheres tristis*

Paradisea tristis Linnaeus, 1766, Syst.

Nat., ed. 12, 1: 167 (模式产地: 菲律宾, 应为印度).

鉴别特征 自嘴角至眼下方、眼后部均裸出。额、头顶黑色, 上体余部灰棕色; 翅和尾黑色, 具白色斑。

形态 (据指名亚种)

雄鸟: 额至头顶黑色, 上体余部灰棕色; 翅和尾黑色, 翅具白色翅斑, 尾羽具黄白色羽端。颈、喉、胸和肋灰棕色; 腹部中央和尾下覆羽污白色; 翅缘和翅下覆羽白色。

雌鸟: 体羽与雄鸟相似。

脸的裸露部分、嘴、脚和趾均桔黄色, 爪角黑色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (3)	115—117	250—260	22—23	140—142	90—93	34—37
♀♀ (3)	100—118	240—242	21—23	128—136	83—93	34—36

亚种分化 家八哥计有2个亚种, 中国有1个亚种。

(1) 指名亚种 *Acridotheres tristis tristis* (Linnaeus)

Paradisea tristis Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1: 167 (模式产地: 印度加尔各答).

形态及量衡度详见种的描述。

国内分布于新疆天山西部, 四川西南部, 云南西北部、西部和南部, 广东及海南(留鸟)。国外见于阿富汗, 尼泊尔, 印度, 斯里兰卡, 马来半岛等地区。




图63 家八哥 *Acridotheres tristis* 的分布图

生态 家八哥多见成对或成群栖息活动于高大乔木上。夜间有固定的栖息场所。繁殖季节在4—8月。营巢于大树或峭壁洞穴内, 衬垫物是草根、草茎、细藤和鸟羽。每窝产卵3—5枚。杂食性鸟类, 主要吃昆虫, 也吃植物果实和种子等。