

9. 白胸翡翠 *Halcyon smyrnensis* (Linnaeus), 1758

别名：白胸鱼狗、翠毛鸟、鱼虎、翠碧鸟、苍翡翠。

英文名：White-breasted Kingfisher.

地理分布 中国南部地区西自四川西南部、云南西部，向东至福建、台湾，南至海南。国外分布从土耳其经伊朗，阿富汗，巴基斯坦，印度，缅甸等。

鉴别特征 它具赤栗色的头与蓝绿色的背和翼、尾等，均极易与蓝翡翠相区别。

形态 (依据华南亚种描述。)

成鸟 头、后颈、上背棕赤色；下背、腰、尾上覆羽、尾羽亮蓝色。翼也亮蓝色，但初级飞羽端部黑褐色，中部内羽片为白色，飞时形成一大白斑；中覆羽黑色；小覆羽棕赤色。颈、喉、前胸和胸部中央白色；眼下、耳羽、颈的两侧、胸侧、腹、尾下覆羽棕赤色。

虹膜褐色；嘴、脚珊瑚红或赤红色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(5)	89.6	264.8	50.8	117.2	75.8	16.7
	(85—93)	(251—285)	(40—56)	(115—122)	(70—83)	(16—17.3)
♀♀(5)	96.6	286.3	55.4	122.6	82.6	15
	(90—100)	(272—300)	(51—58)	(117—128)	(76—88)	(14—16.2)

亚种分化 本种有 6 亚种，我国仅有 1 亚种。

(1) 华南亚种 *Halcyon smyrnensis perpulchra* Madarasz

自四川西南部、云南西部，向东至福建，南至海南（留鸟）；台湾（偶见）。国外分布于缅甸，马来西亚，泰国，中南半岛三国。

形态和量衡度见种的描述。

Halcyon perpulchra Madarasz, 1904, Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hungarici, 2: 85 (新加坡).

Halcyon smyrnensis fusca Peters, 1955, 5: 196.




图 15 白胸翡翠 *Halcyon smyrnensis* 分布图
华南亚种 *H. s. perpulchra* ●

Halcyon smyrnensis perpulchra 郑作新, 1976, 338—340.

生态 平时常见于平原和丘陵的树丛中或沼泽附近，也常停息在电线上或竹林中。飞行疾而不远，且成直线状。叫声如笛，音长而甚尖锐，响彻甚远。

此鸟虽属于啄鱼的鸟类，但觅食并不仅在水中，还常在地面上。所吃的东西并非鱼类，主要为昆虫、螃蟹、蛙、蜥蜴、蠕虫等，几乎无论何物，随捕随吃。动物研究所曾在湖南宜章剖验 2 只鸟，其中一只完全吃螃蟹，另一只的胃中全为昆虫碎片。在云南南部所采的一鸟，曾吃蜈蚣、蟹和蜈蚣等。La Touch 曾在厦门采得 1 只吃了老鼠的白胸翡翠。在印度一带，据 Baker (1927)，此鸟主要吃蝗虫之类。

繁殖时，叫声宏亮，常在将行营巢处往返疾飞，狂叫不休，也常栖于高树无叶的裸枝上喋喋高鸣。

巢营于较大的溪流或河流堤岸，或在距水甚远的山坡崩塌处或山丘坟墓的隧道中，自海平面附近直至海拔甚高的山上，这些隧道是由一对繁殖鸟自己挖成的。据 Baker 对 *H. s. fusca* 的记载，它们有时也利用天然洞穴，而用含泥的苔藓把穴口缩小。巢穴长达 45—60 cm，从不更深，在其端处有一扩大的部分，而卵则产于此扩大部分的裸露土上。产卵在 4—5 月间，每年通常仅一窝，每窝 5 枚以至 6—7 枚。卵儿圆形，呈纯白色，而往往在其端处有白垩色细纹。

经济意义 活鸟华丽，可伺供观赏。身上翠羽可供嵌镶钮扣和其他饰品。

Alcedo smyrnensis Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 116 (非洲及亚洲；土耳其: Amyrna).