

(1) 新疆亚种 *Sturnus vulgaris porphyronotus* (Sharpe)

*Sturnus porphyronotus* Sharpe, 1888, Ibis (5) 6: 438 (模式产地: 中国 莎车).

形态及量衡度详见种的描述。

国内分布于新疆北部准噶尔盆地, 青海东部、祁连山, 甘肃, 宁夏泾源、六盘山、贺兰山, 西藏南部, 河北, 山东, 福建, 广东沿海一带, 云南。国外见于伊朗和印度中部。

(2) 北疆亚种 *Sturnus vulgaris poltaratskyi* Finsch

*Sturnus poltaratskyi* Finsch, 1878, Proc. Zool. Soc. London 713 (模式产地: 阿尔泰).

*Sturnus menzbieri* Sharpe, 1888, Ibis (5) 6: 438 (模式产地: 独联体克拉夫斯克).

*Sturnus zaidamensis* Buturlin, 1904, Orn. Jahrb. 15: 208 (模式产地: 柴达木盆地及祁连山北部).

*Sturnus dzungaricus* Buturlin, 1904, Orn. Jahrb. 15: 208 (模式产地: 新疆准噶尔盆地).




图52 紫翅椋鸟 *Sturnus vulgaris* 的分布图

★ *S. v. porphyronotus*; ● *S. v. poltaratskyi*

本亚种与新疆亚种相较, 背部呈金属绿色而和后者为金属紫色不同。冬羽, 除翅和尾外, 上体羽端具褐白色斑点, 下体具白色斑点, 头、背和喉、前胸沾金属绿色。