

3. 紫背椋鸟 *Sturnus philippensis* (Forster)

英文名: Violet-backed Starling.

Motacilla philippensis Forster 1781, Zool. Ind. 41 (模式产地: 菲律宾).

Motacilla violacea Boddaert, 1783, Tabl. Pl. enlum. Hist. Nat. 11 (模式产地: 菲律宾).

鉴别特征 肩、背紫色具金属光泽; 颊赤色; 前胸栗色; 腹乳白色; 肋蓝灰色。




图48 紫背椋鸟 *Sturnus philippensis* 的分布图

形态

雄鸟: 头部、颊与喉均为淡灰色。耳羽、两颊及后颈两侧为栗色块斑。肩羽、下背和腰紫色并有金属光泽; 尾上覆羽橙黄色。两翅羽外翮黑色, 羽缘和羽端具金属绿色; 第2—4枚初级飞羽有黄色狭缘; 两翅翅缘、中覆羽、腋羽及翅下覆羽白色; 次级飞羽外翮具灰白斑; 飞羽内翮白色。前胸栗色; 后胸和腹乳白色; 两肋和胸侧蓝灰色。尾下覆羽棕黄色。

雌鸟: 额和头部、耳羽及颊灰褐色; 喉污白沾黄; 背灰褐色; 胸污白色; 翅及尾为黑褐色。

虹膜桔红色; 嘴角黑色; 跗蹠铅灰色, 爪灰黑色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (2)	—	180,181	16,17	109,112	46,52	25,26
♀♀ (2)	—	181,182	17,17	108,110	50,52	24,25

生态 常成批结群活动于树枝间。在空中穿梭捕食昆虫。有时也在地上觅食。飞翔时鼓翅迅速, 成横队直线飞行 (张万福, 1985), 喜盘旋飞翔于树梢附近。在大陆较为稀见, 在台湾为常见种。

食物主要是各种昆虫, 有时也吃植物性食物。

地理分布 国内分布于江苏沙卫山, 浙江, 福建 (旅鸟); 台湾兰屿 (冬候鸟)。国外见于日本, 菲律宾和加里曼丹岛。