

11. 红嘴棕鸟 *Sturnus burmannicus* (Jerdon)

英文名: Red-billed Starling.

Sturnia burmannica Jerdon, 1862, Ibis 21 (模式产地: 缅甸).

鉴别特征 头、颈乳白色; 上体黑褐色; 下体主要为葡萄红色。嘴黄, 基部红色。

形态 (据采自云南标本)

雄鸟: 头顶、枕、颈项和颈侧均乳白色; 上背至下背棕褐色; 尾乌黑色, 羽端为棕褐色; 初级飞羽基部有白色块斑; 胸和腹为葡萄红色, 两肋亦沾葡萄红。眼周围黑色。

幼鸟: 上体为暗棕色; 头部为暗褐色。




图60 红嘴棕鸟 *Sturnus burmannicus* 的分布图

虹膜蓝白色; 嘴柠檬黄、基部赤红色; 跗蹠黄色。

量衡度:

| 性别 | 体重 | 全长 | 嘴峰 | 翅 | 尾 | 跗蹠 |
|-------|----------|----------|-------|----------|--------|--------|
| ♂ (2) | 155, 160 | 281, 282 | 30, — | 160, 162 | 93, 95 | 40, 41 |

生态 栖息于热带开阔地次生林和灌木林中, 结群活动于河谷耕作区。

红嘴棕鸟的食性, 根据剖检鸟胃, 食物主要是蝗虫、蚱蜢和鞘翅目昆虫碎片, 偶食野果。

地理分布 我国仅见于云南西部。国外分布于缅甸, 泰国南部和柬埔寨。