

18. 鹩哥 *Gracula religiosa* Linnaeus

别名：了王。

英文名：Grackle.

Gracula religiosa Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 108 (模式产地：印度尼西亚).

鉴别特征 通体黑色，并富有金属光泽；头后有两片橘黄色肉垂。

形态 (据华南亚种)




图69 鹩哥 *Gracula religiosa*

雄性成鸟：嘴须发达；额至头顶辉黑色，头侧被以绒黑色短羽；头后有二片橘黄色肉垂；眼下后方部分裸露；上体的后颈、肩和两翅内侧覆羽均为辉紫铜色；下背、腰及尾上覆羽呈金属绿色；飞羽黑色，第2—7枚初级飞羽内翮横贯白斑，飞翔时更为明显；尾羽黑色，沾辉绿色。颊、喉至前颈紫黑色；前胸铜绿色；腹部蓝紫铜色，腹中央和尾下覆羽羽端具狭窄白色羽缘。

雌鸟：体色与雄鸟相似。

幼鸟：上体褐黑色；头后肉垂缺如；头部裸露部分不如成鸟显著。两肋和腹部具狭窄白色羽缘。

虹膜暗褐，外圈白色；嘴峰橘红色；跗蹠柠檬黄色；肉垂及裸露脸部黄或深黄色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (10)	211 (165—258)	280.4 (255—304)	26.3 (23—34)	163 (155—173)	79.7 (67—92)	35.6 (31—39)
♀ (10)	202 (168—233)	270 (234—293)	26 (23—28)	160 (153—172)	78.7 (65—86)	35 (31—38)

亚种分化 鹩哥计有10个亚种，中国分布有1个亚种。

(1) 华南亚种 *Gracula religiosa intermedia* Hay

Gracula intermedia (sic) Hay 1844 (=1845); Madras Journ. Lit. Sci. 13 (2): 157 (模式产地：印度北部)。

Eulabes hainanus Swinhoe, 1870, Ibis (2) 6: 352 (模式产地：海南岛)。

Eulabes sinensis Swinhoe, 1870, Ibis (2) 6: 353 (模式产地：广东西部，广西)。

形态及量衡度详见种的描述。

国内分布于云南西部和南部，广西西南部和广东，海南岛。国外见于印度和中南半岛等地。




图70 鹩哥 *Gracula religiosa* 的分布图

生态 栖息于开阔田地边缘或常绿阔叶林树冠上。常三五成群活动。善于鸣叫，鸣声富于音韵，会仿效其他鸟类鸣叫。在人工饲养下，可仿效简单人语。每年4—6月为繁殖季节。巢区比较稳定。每窝产卵4—6枚。卵为鲜蓝绿色，无点斑。卵的大小，最大值为39mm×24.8mm及34.8mm×26.5mm，最小值为33.5mm×26mm及35.9mm×24.3mm。

杂食性，吃多种昆虫，也吃榕树果实、种子、乌榄和杂草种子等。种群数量不多，不甚常见，近年来数量锐减，应加保护。

地理分布 国内分布于云南西部和南部，广西西南部，广东，海南（留鸟）。国外分布于印度，斯里兰卡，缅甸，泰国，马来西亚，印度尼西亚等地。