

11. 白领翡翠 *Halcyon chloris* (Boddaert), 1783

英文名：White-collared Kingfisher。

地理分布 江苏沙卫山（4月）。国外分布从非洲埃塞俄比亚到澳大利亚及萨摩亚群岛。

鉴别特征 上体、翼、尾为蓝色。颈领和整个下体白色。

形态 （依据 de Schauensee, 1984 的描述。）

成鸟 上体、翼、尾为蓝色。眼眉、眼下斑点、阔的颈领、整个下体为白色。

虹膜暗褐色；上嘴和下嘴尖端黑色，下嘴基部肉色；脚由灰至淡肉色。

量衡度 （据 de Schauensee, 1984; mm, g）

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
	240					

亚种分化 本种在世界分化为 47 个亚种，在我国仅有 1 个亚种。

(1) 华东亚种 *Halcyon chloris armstrongi* Sharpe

此亚种在国内的分布和种一样。国外见于泰国南部和越南南部。

形态和量衡度见种的描述。

Halcyon armstrongi Sharpe, 1892, Cat. Bds. Brit. Mus., 17: 217, 277, 7 (泰国).

Halcyon chloris armstrongi Peters, 1955, 5: 207; 郑作新, 1976, 340.

生态 栖息于海岸边，偶然至内地。鸣声嘈杂、粗糙，似“krerk, krerk, krerk, krerk”(Ben King, 1983)。食物大多以蟹为主，但也食鱼、昆虫和蜥蜴。

经济意义 此鸟自 La Touche (1925—1934) 报道以来，一直未见有其他人报道，可能此种鸟已在中国灭绝。

Alcedo Chloris Boddaert, 1783, Tab. Pl. enlum. Hist. Nat., 49 (泰国).