

5. 蓝耳翠鸟 *Alcedo meninting* Horsfield, 1821

英文名: Blue-eared Kingfisher.

地理分布 云南南部西双版纳(留鸟)。国外广泛分布于东南亚各地。

鉴别特征 与普通翠鸟很相似,但上体更蓝,颜色也较深;耳羽蓝色;下体深棕色。

形态 (依据云南西双版纳的标本描述。)

成鸟 和普通翠鸟极相似,只是个体较小,耳羽蓝色。头和颈黑色,羽毛端部翠蓝色,具反光;背、腰、尾上覆羽亮蓝色,背、腰较浅,尾上覆羽较深,尾上覆羽较长,达尾羽端部;尾羽黑褐色。翼黑褐色,次级飞羽和所有覆羽的外羽片均具亮蓝色羽缘。眼先基部棕白色,端部棕色;耳羽蓝色;眼下两侧似头部,黑色,羽端部翠蓝色。颊、喉白色;前颈、胸、腹、尾下覆羽深棕色。

虹膜褐色;嘴黑色,基部橙红色;跗蹠珊瑚红色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	20	147	35.5	63	25	7.4

亚种分化 本种有 10 亚种,我国仅有 1 亚种。

(1) 云南亚种 *Alcedo meninting coltarti* Stuart Baker

此亚种在国内的分布与种相同。国外见于从锡金经印度阿萨姆,孟加拉到缅甸南部及老挝。

形态和量衡度见种的描述。

Alcedo meninting coltarti Start Baker, 1919, Bull. Brit. Orn. Cl., 39: 39 (印度阿萨姆: Saddyā); Peters, 1955, 5: 173; 郑作新, 1976, 336.

生态 栖息于热带雨林的河沟或溪旁。1960年5月8日昆明动物研究所在云南西双版纳的勐腊一河沟边见到一对,采得一只。郑作新等(1960)于1958年11月9日在勐腊平坝季雨林中的溪旁采获一鸟(杨岚, 1995)。

经济意义 此种种群数量稀少,分布区也仅限于云南西双版纳的勐腊,故属珍稀鸟类,应该加以保护。

Alcesdo Meninting Horsfield, 1821, Trans. Linn. Soc. London, 13: 172 (印度尼西亚: 爪哇)。