


1. 歌百灵 *Mirafra javanica* Horsfield

地理分布 印度、缅甸、泰国、越南，在中国的分布见属的记述。



分布图 11 歌百灵 *Mirafra javanica williamseni* •

鉴别特征 翅羽沾染棕色或栗色；飞翔姿势类似鹀属鸟类，呈波浪形前进，同时显露出白色的外侧尾羽。下体茶黄，具呈三角形状的褐色纵纹。

形态 (据 Ali et al., 1972. *M. j. cantillans*)

上体暗褐，各羽具棕色羽缘，末端呈淡砂色或近白；翅羽褐色，亦具棕缘，初级覆羽、初级飞羽、外侧次级飞羽更显宽阔，眼先和眉纹棕白、颊部和耳覆羽棕色，端部褐色；中央尾羽褐色，具宽的棕缘，另外三对尾羽羽缘较窄，倒数第二对的外翈棕白，最外侧一对除内翈边缘外全棕白色。颈、喉白色，下体余部淡棕，胸部和胁部较暗具羽轴纹和颈侧带斑黑色。雌雄相似。

虹膜褐色；嘴角褐；跗蹠肉褐。

量度 (据 Baker, 1926)

性别	翅长	嘴峰(从皮基量)	尾	跗蹠
♂ ♀	70—77	12—13	39—48	20—21

分类讨论 歌百灵与其它相似的百灵区别是比较困难的，特别是与云雀和小云雀，不仅在形态上很接近，就是在习性和行为上都容易混淆。可以鉴别之处是它们从空中下降时的姿势和鸣叫方面 (Ali et al., 1972)。

歌百灵各亚种群虽也可看出有变异，但很小，也不很规律，常常既有地理的，也存在个体变异的。如体色暗和淡两种类型，在各自亚种间均有出现。同时 Vaurie (1951) 还提到采自印度孟买南部胡布利的标本由于污染，比其它的标本颜色较红，其中也发现一个没有污染的标本的颜色象北部和西部的类群，而别的标本红色是可以用温的肥皂水洗掉。

在中国，歌百灵虽记录得很早，但至今我们还没有标本，所以这个亚种的材料是相当缺乏的，有必要注意，以利进一步研究。

亚种分化 全世界共有 21 个亚种，中国仅有一个亚种。

(1) **两广亚种 *Mirafra javanica williamseni* Stuart Baker**

本亚种仅记载分布于中国广东省广州湾、广西。不分布国外。

区别于 *M. j. cantillans* 的是上体很暗，羽缘淡色边缘窄而多棕色；翅羽棕色很深；下体羽色暗沉，少茶黄，如似油腻的黄灰色渲染 (Baker, 1926)。

Mirafra cantillans williamseni Stuart Baker, 1915, Bull. Brit. Orn. Cl. 36:9 (模式产地：泰国曼谷)。

生态 单个、成对或集成小群活动。此鸟很活跃，常见不停地在地面奔跑，繁忙地掘觅种子和昆虫。整个繁殖期间雄鸟喜飞鸣，边歌边飞，酷似云雀，但临空高度不如云雀，一般约 30 公尺。到一定高度后，展开双翅，作颤动状，并顺势飘移，忽此忽彼，有进有退。此现象，一次约需 40 分钟，然后骤然降至地面草丛或土块中。类似“表演”，可来回重复。

杂食性。主要取食草籽、蚊、象鼻虫和其它昆虫等。

繁殖期一般在 5 月中旬至 7 月末。也有记载为 5 月到 9 月，繁殖盛期在 6 月中旬的。巢成碟状或浅杯状，以草编织而成，比较精巧。置放于稻田、沟壑边等的草丛中，通常有较好的隐蔽，有的巢利用巢体周围草茎构成一个状似圆屋顶的盖。产卵 2—4 枚，卵色变化较大，有灰色、绿色、黄白色等，表面弥散或稀或密的褐色斑点。50 枚卵大小平均为 19.7×14.6 毫米，最大 20.7×15.0 和 20.6×15.3 毫米，最小的 17.8×14.3 和 18.0×13.9 毫米 (Baker, 1926; Ali et Ripley)。

Mirafra javanica Horsfield, 1821, Trans. Linn. Soc. London 13:159 (模式产地：印度尼西亚爪哇)。

Mirafra javanica, 郑作新 1976, 387; Ali et Ripley, 1972, 5:2—3; Baker, 1926, 3:334; Howard, 1980, 341.

Mirafra javanica williamseni, 郑作新 1976, 387; Baker, 1926, 3:334.

II. 百灵属 *Melanocorypha* Boie, 1828

形态 嘴较粗厚，稍弯曲，鼻孔被羽，翅长，初级飞羽 10 枚，第一枚甚短小，后爪长而直。雌雄相似。

地理分布 全世界有 6 种，其中 4 种分布于中国新疆、青海、西藏、四川、内蒙古、河北以及东北西北部和西南部。国外分布于地中海地区，一直到苏联南部，再向东到巴基斯坦北部，苏联土耳其斯坦。分布在靠北边的类群部分地迁徙到南部地区和非洲北部埃及越冬。

百灵属 *Melanocorypha* 分种检索

1. 胸具黑带..... 2
 胸无黑带..... 3

2. 小覆羽栗黄；外侧次级飞羽大都白色..... [蒙古]百灵 *M. mongolica*
 小覆羽非栗黄色；外侧次级飞羽无白色..... 二斑百灵 *M. bimaculata*

3. 小覆羽栗黄；外侧次级飞羽大都白色..... 白翅百灵 *M. leucoptera*
 小覆羽非栗黄色；外侧次级飞羽仅具白端..... 长嘴百灵 *M. maxima*

Melanocorypha Boie, 1828 Isis von Oken 21:322. 模式种：*M. tartarica* Boie.

参阅：寿振黄，1936, 1:570—572；郑作新 1976, 387—390；Ali, et Ripley, 1972, 5:29—31；Baker, 1926, 3:311—313；Дементьев, 1954, 5:563—582；La Touche, 1925—30, 1:442—444；Ludlow, 1933—4, 68；Vaurie, 1951, 450.