

37. 斑翅朱雀 *Carpodacus trifasciatus* Verreaux (图版 III: 图 6)

英文名: Three-banded Rosefinch.

**地理分布** 仅分布于我国甘肃西南部, 陕西秦岭, 四川松潘、马尔康、宝兴、巴塘, 云南丽江山脉和西藏昌都北部澜沧江流域(留鸟), 西藏南部偏东地区和昌都西南部(冬候鸟)。

**鉴别特征** 雄鸟头顶暗深红色, 颊带黑; 肩与三级飞羽的外翮具白色边缘, 三道翼斑淡粉白色; 雌鸟头与上体灰或橄榄褐色, 具黑色斑纹; 腰鲜橄榄褐色, 翼像雄鸟, 但形成翼斑的覆羽先端为带黄的皮黄色。

**形态**

雄性成鸟: 额、颊、喉、上胸及头侧等均呈珠白色鳞状斑, 而喉部羽毛呈矛状; 头顶、背部羽基黑褐, 有暗红色羽缘, 背部红色外缘更有一圈狭的灰边; 腰羽石板灰色, 沾暗红; 肩羽黑褐, 外翮末段白色, 小覆羽和次级覆羽黑褐, 末段玫瑰红色, 三者在上




图 67 斑翅朱雀 *Carpodacus trifasciatus* ●分布图

形成三道明显横斑; 小翼羽和初级飞羽黑褐, 后者外翮具狭的浅褐色羽缘, 内侧次级飞羽外翮具白缘; 尾上覆羽黑褐, 末端白色, 尾羽黑褐; 胸、上腹及两肋暗玫瑰红色, 腹部正中白色; 尾下覆羽褐色, 末段白色; 翼下覆羽和腋羽灰白, 近翅缘者暗红。

雄性幼鸟: 颇似雌鸟, 唯棕黄色部分均较雌羽棕红。

雌性成鸟: 整体在雄鸟的红色部分转为棕黄色, 上体有明显的黑色条纹, 头无鳞状斑羽。

上嘴角褐色, 下嘴较淡, 基部黄白色; 脚和爪肉褐色。

**量衡度:**

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (1)	29	186	11	85.2	81.8	24
♀ (1)	28	180	11	82	78	21

**生态** 斑翅朱雀一般是中山带鸟类, 在秦岭见于海拔 1200m 的高山针、阔叶混交林中, 在大巴山脉见于 1060—1935m 的松林中, 而在云南玉龙山则见于 4000—5000m 的高山灌丛、草甸和砾石地带。一般不鸣叫。

**经济意义** 斑翅朱雀是我国特产鸟类之一。因分布狭窄, 仅限于陕南、四川至云南北部和西藏东部地区, 而且总的数量不多, 同人类的益害关系目前了解甚少。

*Carpodacus trifasciatus* Verreaux, 1870, Bull. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. 6: 39 (模式产地: 四川宝兴)。