

7. 鹳嘴翡翠 *Pelargopsis capensis* (Linnaeus), 1766

英文名: Stork-billed Kingfisher.

地理分布 云南南部勐腊(留鸟)。国外广泛分布于东南亚各地及印度。

鉴别特征 体大型，嘴如鹳类的。上背有一宽阔的亮棕黄色环带融入下体，上体大都蓝绿色。

形态 (依据杨岚等, 1995。)

雄性成鸟 头顶、头侧及颈部土褐色；上背、肩、内侧飞羽内羽片及翼上覆羽蓝绿色；外侧几片初级飞羽黑褐色，外羽片缘蓝绿色，愈往内侧，蓝绿色部分愈大；内侧飞羽外羽片黑褐色，基部缘以棕黄色，端部沾蓝绿色；尾羽蓝绿；颈侧棕黄色，并向后延伸至后颈，形成领环；下体亦棕黄色，颏、喉颜色略浅。两性同色。

虹膜棕红；嘴红色，具黑端；跗蹠橘红色，爪暗褐色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	205			149		
♂(1)	139	365	82	145	106	15

亚种分化 鹳嘴翡翠有 15 亚种之多，见于我国仅有 1 亚种。

(1) 云南亚种 *Pelargopsis capensis burmanica* Sharpe

此亚种在国内的分布与种相同。国外见于缅甸，泰国，马来西亚北部及中南半岛三国。

形态和量衡度见种的描述。

Pelargopsis burmanica Sharpe, 1870, Proc. Zool. Soc. London, 67 (缅甸: Toun-goo, Pegu).

Pelargopsis capensis burmanica Peters, 1955, 5: 186; 郑作新, 1976, 337.

生态 栖于河边的高树上。食物为小鱼、蛙、虾和蟹等。

经济意义 此鸟种群数量十分稀少，属珍贵鸟类，应该加以保护。

Alcedo capensis Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1: 180 (非洲好望角，实属错误；应为孟加拉：Chandernagore, 据 Stresemann).