

69. 灰颈鹀 *Emberiza buchanani* Blyth

英文名: Grey-necked Bunting.

地理分布 国内仅分布于新疆(繁殖鸟)。国外分布于俄罗斯东部, 蒙古西北部, 土耳其, 伊朗, 阿富汗, 巴基斯坦, 克什米尔和印度。




图 96 灰颈鹀 *Emberiza buchanani* ● 分布图

鉴别特征 头顶和颈灰色; 眼先、眼周、颊纹、颧和上喉白或污白; 下喉和胸淡红褐色, 腹和尾下覆羽淡近白色。

形态 (据新疆亚种)

成鸟: 头部除眼先、眼周及颊纹苍白外, 余部和颈灰色, 背至尾上覆羽淡灰褐; 具淡色羽缘和暗色羽干纹; 翼羽、初级覆羽、飞羽和尾羽暗褐, 小覆羽及初级飞羽具淡褐色羽缘, 其余各羽均缘以淡红褐色, 外侧二对尾羽的外翮具白色羽缘, 内翮具白色楔状端斑。颧及上喉污白沾褐, 下喉及胸为淡红褐色, 腹部转淡, 至尾下覆羽几近白色。胸侧橄榄灰色, 腋及翼下覆羽污白色。

虹膜褐色, 嘴和脚为橙红色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (1)	21	156	11.2	83.5	73	18.6
♀ (2)	20, 22	147	11.5, 11.8	78.2, 80.8	70.1, 74.1	20.6, 21.6

亚种分化 本种共有 3 个亚种, 我国仅有一个亚种即:

(1) 新疆亚种 *Emberiza buchanani obscura* Zarudny et Korejew

分布于我国新疆吐鲁番、乌鲁木齐、乌什及西部喀什和天山一带(繁殖鸟)。国外分布俄罗斯和蒙古等地。

形态详见种的描述。

Emberiza buchanani Var. *obscura* Zarudny et Korejew, 1903 Orn. Monatsb.; 129 (模式产地: Semiretschje-Gebiet, Turkestan).

生态 栖息于新疆海拔 1900m 以下的山地灌丛, 或山坡多石砾和石壁的荒野, 有时也到耕地中。经常在地面单个活动, 以野生植物种子、谷物、幼芽和昆虫等为食。秋后游荡时结群, 且多结成同性群体。

5—6 月间在乌什和吐鲁番繁殖。巢筑于石堆下方或斜坡灌木丛的地面凹处。巢大而疏松, 由草茎和草叶构成, 内垫小草, 偶有些兽毛。卵每产 4—5 枚。卵色差异很大, 从淡绿, 粉色到淡灰色, 具黑色和紫红色斑点和纵纹。

经济意义 此鸟在国内分布, 范围狭窄、数量也少, 对它们的食性分析研究不够, 经济意义尚不够明确。

Emberiza buchanani Blyth, 1844, Journ. As. Soc. Bengal 13: 957 (模式产地: 阿富汗)。