

40. 红眉松雀 *Pinicola subhimachala* (Hodgson) (图版Ⅳ: 图1)

英文名: Red-browed Rosefinch.

地理分布 国内分布在四川灌县、康定、巴塘、木里、峨眉, 云南西北部丽江和片马, 西藏昌都、察隅、聂拉木、林芝、野贡和必村。国外见于缅甸, 尼泊尔, 锡金, 不丹和印度。

鉴别特征 体型较大; 雄鸟的额、颊与胸亮绯红色; 上体渲染淡红褐色, 腰深微红色; 方型尾; 雌鸟无红色而代之以橄榄黄色; 上体渲染淡橄榄绿色; 颊与喉灰带黑色斑纹。

形态

雄性成鸟: 额、眉纹、颊、颧及喉概红色; 眼先污褐色, 眼周淡红色; 耳羽暗红色; 头顶、颈、背、肩和翼上覆羽大都褐色, 具宽的暗红色羽缘; 腰和尾上覆羽鲜红色; 尾羽暗黑褐色, 各羽具红色羽缘; 小翼羽和初级覆羽暗褐色, 具暗红色窄边; 飞羽褐色, 各羽具红色羽缘; 前颈和上胸红色, 各羽基部较暗, 中央线有浅淡圆点, 形成鳞状斑; 下体余部褐灰色, 腹部中央较淡; 尾下覆羽灰色, 微沾红, 长形者羽基暗褐; 翼下覆羽和腋羽褐灰色, 羽缘橄榄黄色, 尤其是近翼缘处更明显。

雌性成鸟: 额、眉纹和上胸金桔黄色, 体羽余部与雄鸟色同, 但红色部分转为橄榄




图70 红眉松雀 *Pinicola subhimachala* ● 分布图

黄色。

幼鸟与雌鸟相似。

虹膜淡褐至红褐; 嘴肉褐色; 腿和脚淡褐色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翼	尾	跗蹠
♂♂ (5)	40—50	198—210	12—13	93.4—99.6	75.4—78.4	20.5—21.5
♀♀ (5)	35—48	170—197	12—12.5	91—98	70—79	21—23

生态 红眉松雀生活在海拔较高的山区, 四川峨眉山见于海拔2000—3000m, 云南玉龙山见于3000—5000m高度, 但冬季却下降到低海拔处。此鸟多栖息于松林、云杉林、栗林及石楠科的小树上和森林上线, 以及山麓矮树丛中, 地面上也能见到。

单独或成对生活, 有时也集成小群活动。两性都能鸣唱, 其歌声是一种清晰而多变的颤音, 还有一种音似“ter-ter-tee”的鸣声。但一般不大鸣叫, 其叫声是一种悦耳的类似麻雀的“chirp”声。

食物主为浆果, 也有各种植物的种子。

经济意义 此鸟虽是美丽的观赏鸟, 由于分布狭窄, 数量稀少, 因此它的经济意义不大。

Corythus subhimachala Hodgson 1836, As. Res. 19: 152 (模式产地: 尼泊尔)。

Propyrrhula subhimachala intensior Rothschild, 1922, Bull. Brit. Orn. Cl. 43: 12 (模式产地: 云南丽江山脉)。