

#### 44. 血雀 *Haematospiza sipahi* (Hodgson) (图版 IV: 图 2)

英文名: Scarlet Finch.

**地理分布** 国内分布于云南西部怒江与龙川江间山脉、腾冲几大塘和景东、磨刀河以及西藏聂拉木、错那县勒。国外分布于尼泊尔, 印度阿萨姆东北及缅甸东北部山区。

**鉴别特征** 雄鸟除眼先、翼与尾为黑(或淡黑)色外, 通体为鲜红色; 嘴鲜黄; 雌鸟暗橄榄绿色, 羽端较淡或带黄色; 腰鲜黄; 嘴较暗。

#### 形态

**雄性成鸟:** 眼先、嘴基线和眼周紫红色; 尾及翅黑褐色, 具红色羽缘; 尾下覆羽暗, 具宽的红色尖端; 腋羽和翼下覆羽灰白色, 具红色先端, 其余体羽大都鲜深红色, 而头和颈羽基部白色, 其他部分羽基灰色; 翼下覆羽和腋羽深灰色。

**雌性成鸟:** 上体从头至背, 包括翼上覆羽和内侧次级飞羽大都暗褐色, 各羽具宽的橄榄绿色羽缘, 而头羽最鲜亮; 腰和短的尾上覆羽鲜黄色; 尾羽褐色, 外侧尾羽具暗橄榄色外缘; 眼先、眼肉淡橄榄黄色, 耳羽暗褐, 沾橄榄黄, 并具白色轴纹; 颊橄榄黄色; 喉灰白, 沾橄榄黄色, 羽中央具斑点; 下体余部灰色, 羽中央多少具暗色斑, 呈鳞片状; 尾下覆羽白色, 沾橄榄黄色; 翼下覆羽和腋羽发灰, 亦沾橄榄黄色。

**雄性幼鸟:** 大体似雌鸟, 但腰羽呈桔色, 上体多桔红而非黄绿色。

虹膜褐色; 嘴黄色; 腿和脚褐色。

#### 量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (3)	40,43.6,47	155,165,182	13,14,15	95,100,105	68,70,71	19,21,22
♀♀ (2)	39,44	172,178	13,14.4	98,98.5	66,70.4	18,20

**生态** 血雀属于山区森林鸟类, 一般生活于海拔 2000m 左右, 在云南高丽贡山可达 3000m 以上, 在西藏聂拉木可达 4000m, 有垂直迁徙现象。冬季常游荡到低海拔地区, 但不到平原。此鸟喜栖松杉林、郁林林缘的小乔木上和山坡稀树灌丛中。性好群居, 常由 5—6 只个体组成小群, 也见单个活动者。飞翔速度较快。叫声是一种宏亮悦耳的“too-eee”或“pleeau”声, 以及一种“kwee-i-iu”或“chew-we-auh”声。其歌声是一种清晰柔合的“par-ree-reeeeee”旋律。

食性属于杂食性的, 食物中植物、动物均有, 包括球果、浆果、植物种子和各种昆虫及其幼虫。

血雀在西南山地繁殖。巢筑于松林外缘的松枝上。巢大而厚呈杯状, 外壁由细枝和粗枝编成, 内层为树枝和植物纤维, 巢内垫以兽毛。卵底色浅蓝, 上有鲜褐色和紫褐色点斑和线条。卵的大小为 27 (22—25) mm×17.5 (17—18) mm。

**经济意义** 血雀是美丽的观赏鸟类, 因数量太少, 应严禁捕猎, 以资保护。

*Corthus sipahi* Hodgson 1836, As. Res. 15: 151 (模式产地: 尼泊尔)。