

25. 赤朱雀 *Carpodacus rubescens* (Blanford) (图版 I: 图 4)

英文名: Crimson Rosefinch.

地理分布 国内分布于甘肃西南部, 四川二郎山, 峨眉山、宝兴, 云南丽江山脉和西藏昌都、聂拉木等地(留鸟)。国外分布于尼泊尔, 锡金和印度阿萨姆。




图 56 赤朱雀 *Carpodacus rubescens* ● 分布图

鉴别特征 雄鸟体色深红, 额、眉纹、头顶、头侧及翼斑概鲜红色; 颊暗; 腹部淡灰; 雌鸟上体纯色, 下背和腰带黄或微染淡红褐色, 下体无斑纹。

形态

雄性成鸟: 额、头顶、眉纹和颈均淡赤红色; 背、肩、腰及尾上覆羽赤红褐色; 大覆羽、小翼羽、初级覆羽及飞羽暗褐色, 羽缘红褐, 尤以大覆羽较深; 尾羽褐色, 具红褐色羽缘, 头侧、眼前后均褐, 杂以红色; 颊、耳羽、颞及喉玫瑰红色, 至胸和两肋杂以烟褐色; 尾下覆羽淡烟褐色, 具粉白色羽缘; 翼大覆羽和腋羽灰色, 微沾淡红色。

雌性成鸟: 上体暗褐, 具赭色羽缘, 背羽中央暗色; 尾羽褐色, 具红褐色狭缘; 翅暗褐, 覆羽和内侧次级飞羽的外翮和尖端红褐; 头侧、颈和下体纯淡赭褐色, 腹部中央色较淡; 翼下覆羽和腋羽灰色, 后者羽缘赭褐色。

虹膜暗褐; 嘴淡角褐色, 下嘴较淡微黄; 脚浅褐色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (3)	18, 20, 21	135, 139, 155	13, 14, 14	78, 80.6, 84	50, 63, 65	18, 18, 19
♀♀ (2)	20, 22.5	143, 150	10, 13	81, 80.5	57, 56.4	19, 19

生态 赤朱雀是高山森林鸟类, 在四川峨眉山见于海拔 2000—3000m 处, 二郎山于 6 月 7 日见于 2400—2500m 处, 而云南玉龙山可见于 3000—4000m 处; 但在西藏南部, 冬季仅见于海拔 2000m 以下地区。此鸟喜在开阔地区, 也在针叶林和灌木丛中。食物主要为植物的。鸣声响亮很似钟声; 一般叫声是一种短促、细而高的基音“sip”, 还有一种叫声是短促或突然间断但又很快升高和降低的“pitch-ew, pitch-it, chit-it, chil-ew”等音节的连续, 这些音节也可单个地被发出。

经济意义 赤朱雀在我国分布范围狭窄, 数量也不多, 故无显著经济价值。

Procarduelis rubescens Blanford 1871, Proc. Zool. Soc. London: 694 (模式产地: 锡金)。

Procarduelis rubescens saturator Rothschild 1922, Bull. Brit. Orn. Cl. 43: 12 (模式产地: 云南怒江与龙川江间山脉)。