

9. 台湾暗蓝鹊 *Urocissa caerulea* Gould

英文名: Taiwan Blue Magpie.

Urocissa caerulea Gould, 1862, Proc. Zool. Soc. London (模式产地: 台湾).

鉴别特征 体形大小似红嘴蓝鹊，但体色暗蓝，红嘴，长尾。

形态 (据 Goodwin, 1976)。体形大小和比例似红嘴蓝鹊，但色泽浓暗，尾没有红嘴蓝鹊那样长而弯曲。头、颈和胸黑色，身体其他部分羽色为较暗的淡紫蓝色，下体稍微较淡一些，尾下覆羽羽端白色。翅上有白斑；尾似红嘴蓝鹊，但内翈的灰色较深暗，近似于黑色。

虹膜亮黄色；跗蹠亮珊瑚红色。

幼鸟较暗较灰，下体自淡黑色的胸部以下几乎完全是灰色。

量度 (据大连博物馆收存的一个残尾而性别不明的标本):

嘴峰38mm 翅214mm 跗蹠55mm

地理分布 仅分布于我国台湾。

生态 分布于海拔300—1800m 的阔叶林中层树干和树枝间，或砍伐过的疏稀林间。以螃蟹、小鸟、果实或腐死动物为食。性极凶猛，不易与其他鸟类共栖。常三五只成群沿斜坡飞翔。每年4—5月繁殖，每窝卵7—8枚。




图85 台湾暗蓝鹊 *Urocissa caerulea* 分布图