

25. 家鸦 *Corvus splendens* Vieillat

英文名: House Crow.

Corvus splendens Vieillat, 1817, Nour. Dict. Hist. Nat., ed. 8: 44 (模式产地: 孟加拉).

鉴别特征 体形较小, 似黑色型达乌里寒鸦, 但嘴较细长, 后颈乌暗。

形态 (据采自云南勐腊的标本)

成鸟: 前额、头顶、眼先、颊、颞和喉深辉黑色; 颈项、耳羽、上背、胸淡褐黑; 尾羽和上体剩余部黑色闪紫辉; 下体深褐色。

虹膜黑褐; 嘴、跗蹠和趾黑色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (7)	280,310,	405,407,	49.7	257.7	164.7	45.8
	280,312	424,413	(46.5—51.5)	(241—271)	(153—174)	(43—48.2)
♀♀ (6)	250,250	405,392,	44.9	249.3	157.8	45.8
		410	(42—47)	(226—258)	(144—168)	(42.5—47.5)




图 116 家鸦 *Corvus splendens*

亚种分化 计有 5 个亚种, 中国有 1 个亚种。

(1) 西南亚种 *Corvus splendens insolens* Hume

Corvus insolens Hume, 1874, Stray Feathers, 2, p. 480 (模式产地: 缅甸的 Tenasserim).

形态和量衡度详见种的描述。

分布于西藏南部春丕山谷 (5 月); 云南西部以及南部及东南部 (留鸟)。国外分布于缅甸和泰国。




图 117 家鸦 *Corvus splendens* 的分布图

生态 栖息于山谷河流两侧的高大乔木上, 但亦常到平原耕地附近活动, 有时甚至到居民点附近, 寻食人们抛弃的食物碎屑, 觅食昆虫、小动物 (包括蜥蜴、小鸟、鸟卵)、各种草子、果实、种子。