

28. 白颈鸦 *Corvus torquatus* Lesson

英文名: Collared Crow.

Corvus torquatus Lesson, 1831, Traite Orn.: 328 (模式产地: 原始文献是“nouvelle Hollande”不知所指, 实属错误, Schlegel 认为是在中国).

鉴别特征 体形比达乌里寒鸦大, 除颈背和胸有一白圈外, 其余体羽全黑。

形态 (据采自陕西标本)

成鸟: 后头、翕的上部延伸至上胸白色, 这些白羽基部灰色, 羽轴亦灰色; 其他体羽黑色; 喉羽披针状; 头和喉闪淡紫蓝光泽; 初级飞羽外翈闪淡绿光泽。

虹膜褐色; 嘴、跗蹠、趾、爪均黑色。

雌雄同色。幼鸟羽色与成鸟相似, 但白色部分不著, 而显土黄或浅褐色; 黑色部分暗纯, 且无紫绿色闪光。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(10)	558 (480—650)	492.5 (460—534)	51.7 (46—62)	329.8 (315—358)	196 (177—212)	63.3 (60—69)
♀♀(7)	470.1 (424—520)	474.3 (439—497)	51.8 (47—55)	326.4 (315—340)	191.8 (184—202)	61.6 (56.5—65)




图 122 白颈鸦 *Corvus torquatus*

地理分布 国内分布于? 东北沈阳; 河北西达山西南部, 陕西南部, 甘肃东南部, 四川雅安及康定, 云南东北部永善, 南抵福建, 广东及海南岛(留鸟); ? 台湾。国外分布于文莱北部。

生态 录自李桂垣等《四川资源动物志》第3卷鸟纲: 分布较广, 但数量远不及大嘴乌鸦和秃鼻乌鸦。常见于平原、丘陵和低山, 也见于海拔2500m左右的山地。多栖于开阔的农田、河滩和河湾等处, 在地上, 特别在新耕和施肥地上, 缓步觅食。清晨飞到田野觅食, 晚上很晚才飞回村旁或林缘的树上过夜。在地上觅食时常一步一步地向前移动, 不时扭头向四处张望。性机警, 比其他鸦类更难接近, 见人走近, 离很远就飞走。鸣声较其他鸦类宏亮, 常边飞边叫, 似“kaar-kaar”声。栖止时, 多伸颈鸣叫。

杂食性, 据12个胃的剖检: 大部分是动物性食物, 包括鞘翅目金龟虫、步行虫、锹形虫、半翅目红娘华、鳞翅目幼虫以及蜗牛、泥鳅、小鸟等; 植物性食物包括玉米、土豆、黄豆、小麦及草子。

巢筑在高大树上, 产2—6卵, 通常3—4枚, 卵色淡蓝绿, 具橄榄褐色条纹及块斑。




图 123 白颈鸦 *Corvus torquatus* 的分布图