

21. 黄嘴山鸦 *Pyrrhocorax graculus* (Linnaeus)

英文名: Yellow-billed Chough.

Corvus graculus Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1: 158 (模式产地: 瑞士).

Pyrrhocorax graculus, Ali and Ripley, 1972, 236—238; Baker, 1922, 70—71; Goodwin, 1976, 157—160; Vaurie, 1954, 6—7; 1959, 162—163; 中国科学院青藏高原综合科学考察队, 1983, 192—193; 王香亭等, 1991, 656—657; 李德浩等, 1989, 385—386.

鉴别特征 通体黑色, 嘴和跗蹠黄色。

形态 (据普通亚种)

成鸟: 体形似红嘴山鸦但体较细弱, 嘴亦较短。体羽纯黑色, 翅及尾显金属绿色闪光; 馆藏标本羽化后头顶、上背及下体呈乌黑色而无光泽。

虹膜褐色; 嘴黄色 (馆藏后退色呈象牙黄白色或角白色); 跗蹠黄色 (馆藏时间长退色呈污灰色)。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (8)	230.8 (202—254)	380.8 (335—420)	34.5 (29.5—43)	280 (265—295)	181.8 (150—205)	43.3 (40.5—46)
♀♀ (2)	290, 192	380, 331	40.5, 30.5	268, 230	155, 168	42, 44




图 107 黄嘴山鸦 *Pyrrhocorax graculus*

观察标本: 新疆 3♂♂, 甘肃 1♂, 青海 3♂♂、1♀, 西藏 1♂、1♀。

亚种分化 黄嘴山鸦分化有 2 个亚种, 中国分布有 1 个亚种。

(1) 普通亚种 *Pyrrhocorax graculus digitatus* Hemprich et Ehrenberg

Pyrrhocorax alpinus var. *digitata* Hemprich et Ehrenberg, 1833, Symb. Phys. fol. 2. (模式产地: 叙利亚; Lebanon).

Pyrrhocorax forsythi Stoliczka, 1874, Str. Feath. 2: 462 (模式产地: 克什米尔东部地区).

形态及量衡度详见种的记述。

国内分布于内蒙古阿拉善, 新疆乌依塔克、塔什库尔干、麻札、盖孜、阿克塔干、乌夏巴什、苏可皮亚、喀什、天山、温宿, 青海柴达木盆地、互助、久治, 甘肃兰州、武威、天祝、玛曲, 四川美姑、康定、理塘、巴塘、松潘, 西藏札达、聂拉木、布署、札木曲、加雄河谷、西藏南部和昌都地区北部。国外见于西亚, 中亚和南亚等地区。

生态 黄嘴山鸦栖息活动于 2500—5000m 或更高的多峭壁山崖环境, 常寻食于较开阔的高山牧场和草地, 也见于高山耕地附近, 喜在垃圾堆中寻食, 曾记录它们为了检食人类的残羹剩饭, 跟随登山队到 8100m 的高山。多集群活动, 也见其和红嘴山鸦 (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)、渡鸦 (*Corvus corax*) 混群在登山队驻地附近拣取食物。




图 108 黄嘴山鸦 *Pyrrhocorax graculus* 的分布图

杂食性鸟类, 取食昆虫、蜗牛及其他无脊椎动物, 也吃小形脊椎动物如鼠类等; 植物性食物有各种浆果, 如野樱桃、黑刺果。5 月在聂拉木胃检有昆虫和草子, 7 月在札达胃检有黑刺果和大米。

4—5 月繁殖, 巢筑于山间崖壁凹陷洞穴或缝隙中, 由枯枝、干草、须根类和苔藓构成杯状巢。每窝卵 4 枚, 卵色苍白或淡绿, 具大小不等的红褐、橄榄灰褐或淡紫色斑点。

地理分布 国内分布于内蒙古, 新疆, 甘肃, 青海, 四川, 西藏。国外见于欧洲, 亚洲和非洲一些国家和地区。