

7. 黄嘴蓝鹊 *Urocissa flavirostris* (Blyth)

英文名: Yellow-billed Blue Magpie.

Psilorhinus flavirostris Blyth, 1846, Journ. As. Soc. Bengal 15: 28 (模式产地: 印度大吉岭).




图81 黄嘴蓝鹊 *Urocissa flavirostris*

鉴别特征 似红嘴蓝鹊, 但嘴是黄色; 具淡紫蓝色的长尾, 尾端白色。

形态 (据云南维西采的标本) 头、颈和胸黑色, 颈项白色, 头枕部具白色块斑; 背、肩、腰及尾上覆羽淡紫灰色, 但尾上覆羽末端具较浅淡的窄带和黑色端斑; 翅上覆羽淡紫蓝色; 飞羽外翮均紫蓝色, 内翮为褐色至黑褐色, 所有飞羽端部均白; 中央尾羽紫蓝色, 端白; 外侧尾羽具黑的次端斑和白色端斑, 内翮暗。下体灰胸, 以下灰白色沾紫红, 尾下覆羽近白色。

虹膜黄色, 黄褐色; 眼缘黄色或淡黄褐色; 嘴蜡黄; 跗蹠橙黄色, 爪较暗。

量衡度:

| 性别 | 体重 | 全长 | 嘴峰 | 翅 | 尾 | 跗蹠 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| ♂♂ (3) | 170, 145, | 616, 620, | 37, 36.8, | 184, 189, | 437, 463, | 51, 48, |
| | 160 | 610 | 38 | 181 | 408 | 47 |
| ♀♀ (3) | 127, 130, | 533, 563, | 33.8, 32, | 175, 176, | 377, 370, | 43, 43, |
| | — | 572 | 37 | 183 | 379 | 46 |

观察标本: 云南 (维西1♂, 泸水1♂、1♀, 贡山1♂、2♀♀、1♂)。

地理分布 国内分布在西藏昌都地区西南部, 云南澜沧江、腾冲 (留鸟)。国外分布于尼泊尔, 印度, 缅甸和越南。

亚种分化 计有4个亚种, 中国分布1个亚种。

(1) 指名亚种 *Urocissa flavirostris flavirostris* (Blyth)

Psilorhinus flavirostris Blyth, 1846 Journ. Asiat. Soc. Bengal 15: 28 (模式产地: 印度大吉岭)。




图82 黄嘴蓝鹊 *Urocissa flavirostris* 的分布图

形态及分布详见前文。

生态 栖息于阔叶林区, 3—5只集成小群在林缘或林间空地的灌丛间活动, 到地面觅食各种甲虫、膜翅目昆虫以及草子; 不甚畏人。