

1. 黑头噪鸦 *Perisoreus internigrans* (Thayer et Bangs)

英文名: Black-head Jay.

Boanerges internigrans Thayer et Bangs, 1912, Men. Mus. Comp. Zool. Harvard Call. 40: 200

(模式产地: 四川北部松潘附近).

Perisoreus internigrans, Goodwin, 1976, 254—255; Mayr et Greenway, 1962, 240; Vaurie, 1959, 135—136; 中国科学院青藏高原综合科学考察队, 1983, 184—185; 王香亭等, 1991, 645—646; 郑作新, 1976, 493; Cheng Tso-hsin, 1987, 529.

鉴别特征 体形似乌鸦但较小。体羽呈黑及灰褐色, 通体无鲜亮色调。

形态 (据采自甘肃及青海标本)

雄性成鸟: 额、头顶、头侧、颈侧、眼先、耳羽及鼻须概黑色; 新采标本嘴色向后至上颈色较暗呈不甚明显的半环状斑 (馆藏时间长的标本因狐化无此特征); 肩、背、腰及尾上覆羽黑褐色沾蓝 (狐化标本乌灰色沾褐、最长的尾上覆羽沾棕褐)。翅羽黑褐色, 羽轴辉黑 (江达采得一雄鸟一侧初级覆羽第1枚纯白色, 另一侧具白色缘; 青海斑玛采得一雄鸟, 初级覆羽一侧有1枚为白色, 另一侧有2枚为白色)。尾羽黑褐色, 中央尾羽具隐斑, 外侧尾羽隐斑不著且愈向外侧隐斑愈少。颈、喉黑色 (狐化标本暗烟灰色); 胸、腹、胁辉黑褐色 (狐化标本乌灰色沾褐); 尾下覆羽浅灰沾淡黄。覆腿羽黑色; 腋羽烟灰色。

雌性成鸟: 羽色似雄鸟, 但颈、喉色较浅淡, 尾下覆羽灰色。

虹膜暗褐; 嘴角褐, 先端和下嘴底部亮乳白色; 跗蹠和趾黑褐 (或角褐色), 爪黑色。




图74 黑头噪鸦 *Perisoreus internigrans* 的分布图

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (3)	100,108,	325,315,	23,23	163,161,	163,166,	40,41,
	—	—	24	172	167	42
♀♀ (4)	89,—,	288,—,	23.5,22,	163,166,	156,166,	40,40,
	92,94	308,285	24,24	160,162	165,164	42,41

观察标本: 甘肃 (1♂ 1♀)、青海 (1♂ 1♀)、四川 (1♂ 2♀♀)、西藏 (1♀)。

生态 栖息活动于山地针叶林较开阔的地带, 多单个或成对活动。成对活动时, 二者一前一后的鱼贯飞行于树林间, 前后相距不甚远并不时发出鸣叫而相互呼应, 鸣声似“ga-a, ga-a”, 第1音节重, 第2音节较轻。林间飞行时, 多直线飞行。每次飞行距离不远, 当遇惊时则飞往远处。

杂食性鸟类, 甘肃剖检2胃, 食物为鞘翅目昆虫碎片和植物性食糜; 青海剖检6月和8月采得的2个胃, 食物有鸟卵碎片和金龟蚬。

地理分布 国内分布于甘肃卓尼, 青海东南部斑玛, 四川松潘、马尔康、德格, 西藏江达。我国特产鸟类, 不分布于国外。