

13. 黑额树鹊 *Dendrocitta frontalis* (McClelland)

英文名: Black-browed Tree Pie.

Dendrocitta frontalis McClelland, 1839, Proc. Zool. Soc. London: 163 (模式产地: 印度阿萨姆).

Dendrocitta frontalis kurodae Delacour, 1927, Bull. Nrit. Orn. Cl., 47, p. 165 (模式产地: 越南北部 Backan).

鉴别特征 头部黑色; 背、上腹灰色; 腰和下腹、尾下覆羽、腿褐栗色。

形态 (据 Goodwin, 1976)。前额、头顶、颊部、喉和上胸黑色; 颈项、颈、上翕部和胸银灰到亮淡蓝灰, 与黑色头部间有一青白色的分界线, 尤其是颈侧的分界线常是白色; 翕部(灰色的上翕部以下)和背为暗茶褐或茶栗色、稍沾橄榄色, 然后逐渐变为亮淡棕茶色的腰部和栗色的尾上覆羽; 大覆羽、初级飞羽、次级飞羽和尾羽黑色; 胫羽灰色沾茶色。

虹膜红褐或暗红; 嘴、腿和趾黑色。

幼鸟较乌暗, 灰色羽大多具浅褐尖端。




图 91 黑额树鹊 *Dendrocitta frontalis* 的分布图

量衡度 (录自 Baker, 1922):

全长约370—380mm 嘴峰约25mm 翅长120—126mm。

尾长245—255mm 跗蹠约30mm。

地理分布 国内分布于云南的中缅交界处。国外分布于印度, 尼泊尔, 缅甸, 越南。

分类讨论 本种自1879年根据在印度阿萨姆所采标本订名以来, Delacour 在1927年根据采自越南北部 Backen 地区的标本订一亚种——*D. f. kurodae*, 郑作新 (1976, 1987) 承认此亚种, 将分布于我国中缅交界处的亚种认为是指名亚种。Goodwin (1976) 和 Vaurie (1962) 研究后认为 *D. f. kurodae* 亚种与西部地区的标本的区别仅在于较乌较暗, 差别很微, 故将其否定。因在国内至今尚无此种标本, 故有待进一步研究。