


## 9. 台湾鹎 *Pycnonotus taiwanus* Styan

**地理分布** 台湾东部花莲、台东和南部高雄(留鸟)。不见于国外。



分布图 66 台湾鹎 *Pycnonotus taiwanus* ●

**鉴别特征** 与白头鹎酷似。头黑；颊和耳羽白色；近下嘴基部具橙红色小斑点，与白头鹎易于区别；上体灰褐而染橄榄色；翅、尾暗褐，具橄榄黄外缘；下体棕白色；尾下覆羽外缘以橄榄色。

**形态** 头顶和枕黑色；眼先及耳羽白而带银皮黄色；喉白；髭纹呈黑色；近下嘴基部具一小形橙红点斑；后颈浅土褐色；背、肩、小覆羽以及腰羽概污灰褐，微缀橄榄色；大覆羽、飞羽和尾羽均暗褐，外缘以鲜橄榄黄；下体皮黄白；胁和覆腿羽染以灰褐色；尾下覆羽具橄榄色羽缘。

嘴黑色；脚暗褐色。

量度：

性别	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀	约 197		约 87	约 74	
(Styan, 1893)					
♀♀		(16.5—18.0)	(77—87)	(74—81.5)	
(陈兼善, 1969)					

**分类讨论** Hachisuka 等(1950)在有关台湾鸟类论著中认为 *P. sinensis* 和 *P. taiwanus* 的分类地位在台湾是错综混乱的。台湾鹎与白头鹎两广亚种 (*P. s. hainanus*) 和台湾亚种 (*P. s. formosae*) 酷似，又与红耳鹎及黄臀鹎有较近的亲缘关系（见白头鹎“分类讨论”）。它们与白头鹎在台湾的分布是不重叠的。据此，它们在分类地位上应独立为一个种或构成白头鹎种下阶元的一个类群乃是今后需作研究的课题之一。

**生态** 不详。

*Pycnonotus taiwanus* Styan, 1893, *Ibis* (6)5:470 (模式产地：台湾)。

*Pycnonotus taiwanus*, 郑作新, 1976, 445; Mayr *et* Greenway, 1960, 9:234.