

## 5. [日本]歌鸲 *Luscinia akahige* (Temminck)

英文名 Japanese Robin.

**地理分布** 繁殖在日本北部。冬时南迁中国，经河北、江苏沙卫山，而在两广、福建西北部越冬，偶见于台湾和香港。

**鉴别特征** 体形大小似麻雀；上体草黄褐；雄鸟喉部橙棕色，十分明显，雌鸟却转为淡橙黄色。

### 形态

**雄性成鸟：** 额、头和颈的两侧，颏、喉及上胸等概深橙棕色，非常显明夺目，颏部中央微有一条黑色细纹；上体包括两翅表面均草黄褐色，此色在头顶上与额的橙棕色相混；尾栗红；下胸及两胁灰色；上胸和下胸之间有一道狭窄黑带；腹和尾下覆羽均白。下体前部橙棕，后部中央白而两胁灰，彼此相衬益彰。

**雌性成鸟：** 上体似雄而稍淡，尾转为淡红褐色；雄鸟的橙棕色变为淡橙黄，胸无黑带；两胁均褐。

虹膜近黑；嘴暗褐；脚和趾棕灰。

### 量衡度：

性别	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	140	12	76	55	30.5
♀(1)	133	12	69	52	29
♂♂	—	12—13	74—78	49—56	27—29
♀♀	—	12—13	73,76	50—56	27—29

据 La Touche

**亚种分化** 本种在日本南部还有一亚种 *Luscinia a. tanensis* (Kuroda)，但不见于中国。

**生态** 此鸟在中国至今还未见有繁殖纪录。在越冬时，见于混交林的潮湿下木间，偶尔遇见于低地。




图 6 [日本]歌鸲 *Luscinia a. akahige*

*Sylvia akahige* Temminck, 1835, in Temminck and Laugier, Pl. col. Ois. 96: pl. 571 (模式产地: Ryukyus, error for Japan; restricted to Hondo by Kuroda, 1923).

*Luscinia akahige*, 郑作新, 1958, 124; Vaurie, 1959, 387; 郑作新, 1987, 575.

*Erythacus akahige* Dementiev 等, 1954, 615—616; Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 38; Étchécopar et Hue, 1983, 132; de Schauensee, 1984 346; Flint 等, 1984, 231—232.