

14. 栗腹歌鸲 *Luscinia brunnea* (Hodgson)

英文名 Indian Blue Robin, Blue Chat.

地理分布 繁殖于甘肃东南部,四川北部茂汶、中部灌县、瓦山、峨眉、西南部木里,陕西太白山,云南西北部丽江、西部腾冲、西藏南部聂拉木、昌都地区西南部。在国外,见于尼泊尔,不丹,印度北部喜马拉雅地区,缅甸北部,冬迁至印度南部及斯里兰卡。

鉴别特征 雄鸟上体灰蓝,下体大都栗色,白色眉纹非常明显。雌鸟上体橄榄褐色,下体白而带赭棕色。

形态

雄性成鸟: 额、眼先、头和颈的两侧均黑;一条显著的白色眉纹,从眼先上部直伸至后颈的两侧;头顶至尾概灰蓝色;两翅暗褐,翼上覆羽亦灰蓝,与背同色;喉、胸以及腹侧纯栗;腹部中央及尾下覆羽均白。

雌性成鸟: 上体橄榄褐色,眼先及头部两侧沾茶褐色;下体白而带赭棕色,特别是胸及两肋。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(7)	12-18	126-140	12-14	72-79	51-60	25-26
♀(1)	14	125	12	73	51	25

本种有 2 个亚种,但在国内只产指名亚种。

生态 在西藏南部,栖息于海拔 1 000 多米高度的林缘,单个或成对地活动在常绿阔叶林下灌木丛中。在地上驰走时,不时疾急把其尾羽向上翘起或向左右展开着。5—6 月繁殖期中,雄鸟常停在枝头上不断歌咏,鸣声婉转动听。胃内检有鞘翅目、膜翅目等昆虫,还有少许草籽。

Luscinia brunnea Hodgson, 1837, Jour. As. Soc. Bengal 6: 102 (模式产地: 尼泊尔)。

Luscinia brunnea dendrobiastes Streaemann, 1924, Orn. Monatsb. 32: 81 (模式产地: 四川灌县和瓦山)。

Luscinia brunnea Baker, 1924, 14.

Luscinia brunnea 郑作新, 1958, 125; Vaurie, 1959, 386; 彭燕章等, 1980, 254; 郑作新等, 1983, 208;




图 13 栗腹歌鸲 *Luscinia b. brunnea*




图 14 蓝歌鸲 *Luscinia cyane*

吴至康等, 1986, 260; 郑作新, 1987, 583.

Erithacus brunnea Ripley (in Mayr and Payntner), 1964, 46; Étchecopar et Hue, 1983, 140; de Schauensee, 1984, 345; Ali and Ripley, 1987, 567.