

11. 棕头歌鸲 *Luscinia ruficeps* (Hartert) (图版 I, 图 4)

英文名 Rufous-headed Robin.

地理分布 分布于陕西西南部秦岭山脉的太白山及四川平武县王朗自然保护区。在国外,仅采得自马来西亚。

鉴别特征 头橙棕色,十分鲜艳;喉白,相衬益彰。

形态

雄性成鸟(依李桂垣等,1987): 头顶、后颈和头侧均橙棕色,羽缘稍暗;额基、眼先、眼下以及颈侧黑色;背、两肩和腰概暗蓝灰色,有时渲染棕褐色,羽缘稍淡,至尾上覆羽转为暗蓝灰和黑色;中央一对尾羽暗褐,具隐约可见的暗色横斑,外侧尾羽棕红,外缘和羽端棕褐色;两翅褐,外缘以棕色,大覆羽具栗色端斑,形成明显的翼斑;颏和喉白色,微具狭细黑缘;上胸具一黑色横斑,同颈侧黑纹相连,组成椭圆形黑圈,黑白相衬,使白色喉部非常醒目;下胸褐灰,各羽具白端和狭细黑缘,两胁褐灰;腹部和尾下覆羽白色;翅下覆羽褐灰而具白缘;腋羽灰色。

虹膜红褐色;嘴黑褐;脚和趾均肉褐色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(3)	—	—	16—16.5	70—80	52—56	27 (据 Hartert)
♂(1)	19	132	11	78	56	28 (据 李桂垣)

生态 活动于海拔 2 400 米处的杉、桦、杨、山柳和樱桃等灌杂林的地上。鸣声宏亮多韵,悠扬婉啭,十分动听,如其他鸲鸟一样。剖检——胃,内容物除一条蚯蚓外,全系植物碎片。

此鸟的模式标本于 7 月份采自陕西的太白山。1987 年,李桂垣等于 5 月 28 日在四川北部平武又采得一只。从前后采集的日期,可见这种鸟是在秦岭山脉地区繁殖。在马来西亚的 Mt. Brichang, Cameron Highlands (海拔 1 980 米)于 3 月 5 日采到的,当是冬候鸟。

这是非常罕见的濒危种。

Larvivora ruficeps Hartert, 1907, Bull. Brit. Orn. Cl. 19:30 (模式产地: 陕西西南部太白山)。

Luscinia ruficeps 郑作新, 1958, 130; Vaurie, 1959, 381; 郑作新等, 1973, 148; 郑作新, 1987, 582; 李桂垣, 1987, 7.

Erythacus ruficeps Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 45; Étchécopar et Hue, 1983, 138—9; de Schauensee, 1984, 344.