


73. 棕背黑头鸫 *Turdus kessleri* Przevalski (图版 IV, 图 6)

别名 克氏鸫(鸟类试编)。



英文名 Kessler's Thrush.

**地理分布** 国内见于西藏东南部察雅、芒康、左贡、东久、昌都地区北部和西南部，甘肃西部天堂寺一带、西部岷山，青海东北部、东部、东南部、南部及柴达木盆地东缘，四川东北部马尔康、若尔盖、松潘、红原、西北部德格、西部理塘、巴塘、康定，云南中甸。国外见于印度北部(旅鸟)。

**鉴别特征** 两性相异。体形大小似一般鸫类。雄鸟除头、颈以及双翅和尾羽等均黑色外，大都棕白以至栗色。雌鸟除两翅和尾为暗褐色外，余部大都棕黄色。

**形态**(依据青海门源所采的标本)

**雄性成鸟**：上体除头、颈、翅和尾等黑色、上背棕白色外，余均呈深栗色。下体的颈和喉均黑色，胸棕白，向后转为深栗色。

**雌性成鸟**：上体的头、颈等橄榄褐色；耳羽亦然，但具棕白色细羽干纹，两翅和尾暗褐色，余部均黄棕色；颈、喉棕黄，喉侧具少许暗褐斑，胸橄榄褐色，腹亦棕黄色，尾下覆羽暗褐具棕黄色羽端斑。

**雄性幼鸟**(依据四川康定 1961 年 8 月 26 日采到的标本)：头、颈黑褐，但较成鸟色淡，两翅亦黑色，但三级飞羽羽缘暗栗色，背、腰及尾上覆羽棕黄，均具黑色横斑，尤以背部横斑较宽而明显。下体为棕黄色，并布满以黑色横斑。

**雌性幼鸟**(依据 1961 年 8 月 6 日采自四川松潘刷金寺的标本)：头、颈等橄榄褐、翼上覆羽暗褐，具棕白色斑点；两翅暗褐，但三级飞羽羽缘渲染橄榄褐色；上体余部均呈棕白，并布满暗褐色横斑。下体淡棕黄色，亦布满暗褐色横斑。

**量衡度**：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(10)	101 (85—120)	261 (240—292)	22 (20—24)	151 (136—140)	126 (115—140)	36 (32—40)
♀♀(10)	98 (75—110)	247 (240—290)	22 (20—25)	148 (138—165)	123 (120—132)	37 (33—39)

**生态** 在西藏栖息于 3 600—4 500 米林线以上的杜鹃和柳树灌丛中，冬季下迁至海拔 2 100 米处。常成群活动，即使在繁殖季节亦然。常贴近地面飞行，开始鼓翅而后滑飞。

此鸟很少鸣叫。遇见异常时，就发出大而刺耳的惊叫声；平时则发出一种柔和的“dug, dug, dug……”声。

食性不详。

营巢于岩石洞中。巢由草根构成，内垫以鸟羽和其他动物的毛。卵(10 枚)平均大小为 31.5×22.7 毫米(Baker, 1924)。

*Turdus Kessleri* Przevalski, 1876, Монг и Тангут, 2: 62 (模式产地：甘肃)。

*Turdus kessleri* Baker, 1924, 2: 134—135; 郑作新, 1958, 162—163; Vaurie, 1959, 405; Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 10: 200; Ali 等, 1973, 9: 124—125; 彭燕章等, 1980, 273; 李桂垣等, 1982, 1: 127; 郑作新等, 1983, 228; 郑作新, 1987, 637—638.