

18. 棕腹林鸫 *Tarsiger hyperythrus* (Blyth)

英文名 Rufous-bellied Blue Robin.

地理分布 见于西藏东南部,东抵云南省西北部怒江和澜沧江流域(海拔1950—3200米)。国外分布于尼泊尔,不丹以及印度和缅甸的北部等。

鉴别特征 雄鸟上蓝下棕;雌鸟上体大都橄榄褐,下体黄褐。

形态 (据昆明动物研究所,1980)

雄性成鸟: 前额、眉纹、翅上的小覆羽及尾上覆羽等概辉钴蓝色;头顶、后颈、胸的两侧以及上体余部包括两翅和尾的表面,均深紫蓝色;眼先以至耳羽黑而沾蓝色;下体除肛周和尾下覆羽纯为白色外,概辉棕栗色。

雌性成鸟: 上体暗橄榄褐,腰和尾上覆羽灰蓝,尾羽暗褐,具蓝色外缘;头侧、颈侧、胸侧及两胁等均黄橄榄,颏、喉及胸等黄褐,胸部的褐色较浓些;腹部及尾下覆羽纯白。

量衡度 (据昆明动物研究所):

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(6)	12.1	129.3	10.7	76.5	57.3	24.6
	(11—13)	(120—137)	(9—13)	(74—78)	(53—63)	(24—25)
♀♀(2)	11,12	120,125	12,13	71,72	53,58	25,25

虹膜褐色;嘴黑;脚黑褐色。

生态 栖于高山沟谷(在云南高黎贡山地区,海拔为1950—3200米)低处常绿阔叶林下的灌丛,或稀树草地的杜鹃丛间,急速地从灌丛的顶枝跳到另一枝上,觅食小昆虫。繁殖习性未悉。

Ianthia hyperythrus Blyth, 1847, Journ. As. Soc. Bengal 16: 132 (模式产地: 印度 Darjeeling); Baker, 1924, 103—104.

Tarsiger hyperythrus Vaurie, 1959, 391; 郑作新, 1976, 548; 昆明动物研究所, 1980, 149; 彭燕章等, 1980, 256—7; 郑作新, 1987, 588.

Erithacus hyperythrus Ripley (in Mays and Paynter) 1964, 49; Érichecopar et Hue, 1983, 145—146; de Schauensee, 1984, 347; Ali and Ripley, 1987, 650.