

3. 白喉短翅鸫 *Brachypteryx leucophrys* (Temminck)

英文名 Lesser Shortwing, Brown Shortwing.

地理分布 从四川, 云南, 东至福建西北部。在国外, 见于尼泊尔, 不丹, 印度北部, 中南半岛以至印度尼西亚。

鉴别特征 颊和喉纯白; 腹部亦白。

形态 (依据从广西瑶山采得的标本)

雄性成鸟: 上体锈褐色; 无眉纹, 或在眼的上方仅具 1—2 枚白羽; 头与颈的两侧以及两胁, 均与同背同色, 但较浅淡; 颊和喉纯白; 胸羽亦白, 而各缘以浅褐色, 有时这些羽缘还并成一道横带。

虹膜暗褐, 嘴的褐色较深; 脚较浅淡。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(2)	15	115	13.5—14	58—59	40	27—28
♀(1)	—	—	14	61	—	27

分类讨论 de Schauensee (1984) 认为此鸟有两种色型: 褐色型与蓝色型; 在国内主要为褐色型, 如上所述。在印度, 据 Ali (1983) 则主要为蓝色型。

这一种短翅鸫有 5 个亚种的分化, 其中见于国内的, 仅下列 2 亚种。


亚 种 检 索

- 上体橄榄褐色 西南亚种 *Brachypteryx l. carolinae* (17)
上体锈褐色 华南亚种 *B. l. nipalensis* (19)

(1) 西南亚种 *Brachypteryx leucophrys carolinae* La Touche

见于云南西部盈江雪梨(海拔 1500 米)西南部双江及东南部, 广西, 湖南[任国荣], 东至福建西北部(留鸟)。

形态见种的记述。



Brachypteryx carolinae La Touche, 1898, Bull. Brit. Orn. Cl. 8:9 (福建西北部挂墩)

(2) 华南亚种 *Brachypteryx leucophrys nipalensis* Horsfield and Moore

仅见于云南腾冲及四川峨眉山偶见(留鸟)。

形态 体羽褐色带橄榄色。

Brachypteryx nipalensis Horsfield and Moore, 1854, Cat. Bds. Mus. E. Ind. Co. 1: 397 (模式产地: 尼泊尔)。

Brachypteryx nipalensis harterti Weigold, 1922, Orn. Monatsb. 30: 63 (模式产地: 四川峨眉山)。

生态 栖于常绿阔叶林下灌木间近溪流处, 觅食小昆虫和小型螺蛳等。繁殖期中, 鸣声婉转悦耳。据 La Touche (1925—30), 他曾于 5 月 11 日在福建挂墩矮竹间采得一巢, 由竹叶和苔藓等坚实地织成一个椭圆形而有拱顶的结构, 内有 3 个卵, 估计是已满窝的。卵呈淡橄榄绿色, 多少明显地杂以更暗的褐色斑点, 壳面平滑而有光泽。卵的大小为 21.5 × 15 以至 22.5 × 15.5 毫米。

Myiothera leucophrys Temminck, 1827, in Temminck and Laugier, Pl. col. Ois. 76: pl. 448 (模式产地: 印度尼西亚爪哇)。

Brachypteryx leucophrys 郑作新, 1958, 121; Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 15; 昆明动物研究所, 1980, p. 146; 彭燕章等, 1980, 250; Etchécopar et Hue, 1983, 126; de Schauensee, 1984, 343;

Ali et Ripley, 1987, 207; 郑作新, 1987, 573.

图 4 白喉短翅鸫
1. *B. l. nipalensis* ○; 2. *B. l. carolinae* ●