

43. 白喉石鸮 *Saxicola insignis* G. R. Gray

别名 何氏树丛石栖鸟(鸟类试编)。

英文名 Hodgson's Stonechat.

地理分布 国内分布于内蒙古阿拉善,青海札陵湖、南部札多。国外繁殖在原苏联哈萨克山区、阿尔泰山脉及蒙古一带;冬季见于印度北部,尼泊尔,不丹等地。

鉴别特征 上体黑色;翅具大型的白色块斑;尾上覆羽白色;颏、喉白色;胸与腹锈色。

形态 (依据采自青海札陵湖的标本)

雄性成鸟:眼先、耳羽及头部黑色,着以细窄的褐色羽缘;上体黑色,缘以较宽的褐色边缘;尾上覆羽白色,羽端淡棕色;尾羽黑色,具有棕色的窄端;飞羽黑色;大覆羽白色,构成翅上的白色块斑;内侧次级飞羽边缘棕白色;颏、喉白色,多少沾点棕褐色;下体余部大都锈色,上胸部深,腹部色淡;尾下覆羽棕白色。

雌性成鸟(据 Baker, 1924; Ali 等, 1973):上体褐色,翅具两道宽阔的棕褐色横斑;下体淡锈棕色,喉和胸部羽色较暗。

虹膜暗褐色;嘴、跗蹠、趾和爪等均黑色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	22	150	13	86	58	27
♀♀(10)	—	—	9—10	80—84	54—58	25—28

(据 Ali 等, 1973)

白喉石鸮是单型种,至今未见有亚种分化。

生态 见于多岩石的高山上或山下的平原、草地的灌丛中。食物为昆虫、植物等。

Saxicola insignis G. R. Gray, 1846, Cat. Mamm. Bds. Nepal and Thibet: 71 153(模式产地:尼泊尔); Baker, 1924, 2:33—34; Gee, 1926, 216; Dememtiiev 等, 1954, 538—539; 郑作新, 1958, 146; Vaurie, 1959, 339; Érchécopar 等, 1983, 171—172; de Schauensee, 1984, 355; Elint 等, 1984, 225; Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 10:105; Ali et Ripley, 1987, 584—585; 郑作新, 1987, 610.