

29. 白喉红尾鹩 *Phoenicurus schisticeps* (G. R. Gray) (图版 II, 图 1)

别名 白喉鹩(鸟类试编)。  
英文名 White-throated Redstart.

**地理分布** 见于甘肃西北部、西部、西南部、南部及东南部,青海东北部至南部,陕西南部,四川北部、西北部、西部、西南部,云南西北部,西藏南部(留鸟)。国外见于尼泊尔,印度阿萨姆邦及缅甸北部。

**鉴别特征** 雄鸟头顶钴蓝,上体前黑,后为锈棕色,尾亦黑,翅上有一白斑;下体前黑,后部大都锈棕,下喉具一大形白斑,形甚明显。雌鸟上体暗橄榄褐色沾棕,腰及尾上覆羽淡锈棕色,下体褐灰色沾棕,喉部和翅上的白斑,均较雄鸟小。

**形态**

雄性成鸟(繁殖羽): 前额至枕部钴蓝色;额基、头侧、背、两肩等均黑,肩羽端部、腰、尾上覆羽和尾基等均锈棕色;翅黑褐色,内侧覆羽纯白,内侧次级飞羽的外翮具白色羽缘,二者构成一个大形而明显的白色翼斑;肩羽端部锈棕色;尾羽黑色,其基部锈棕色;颞及喉均黑,下喉中央有一不规则的白色块斑,下体余部锈棕色,腹部中央灰白色。

雄鸟(冬羽): 背羽均具棕色羽缘,头部钴蓝色较暗,胸羽具暗黄或灰色狭缘,余部与繁殖羽相似。

雌性成鸟: 上体暗橄榄褐沾棕;腰、尾上覆羽淡锈棕色;翅和尾羽与上体同色,两翅暗褐,白色翼斑较雄鸟略小;尾基棕色,尾羽外翮边缘淡棕色;下体褐灰色沾棕,喉部白斑也较雄鸟小。

虹膜褐色;嘴、跖、趾和爪黑色。

**量衡度:**

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	附蹠
♂♂(10)	21.2 (16-28)	144.1 (138-150)	11.4 (10-13)	78.4 (76-82)	69.4 (66-72)	24.2 (23-25)
♀♀(10)	16-22	140-158	10-12	69-78	63-71	22-24




图 26 白喉红尾鹩 *Phoenicurus schisticeps*

**生态** 性好动,常保持单独或成对活动,出没于灌丛及林缘。食性很杂;据郑作新等(1973,1983)的剖验,胃内检有鳞翅目、鞘翅目(金龟子)等昆虫,还兼食十字花科和蔷薇科的种子;冬季在灌丛中觅食剩余的浆果。

*Ruticilla schisticeps* G. R. Gray, 1846, Cat. Mamm. Bds. Nepal et Thibet: 69, 153 (模式产地: 尼泊尔)。

*Phoenicurus schisticeps beicki* Stresemann, 1927, Orn. Monatsb. 35:134 (模式产地: 青海门源老虎口)。

*Phoenicurus schisticeps* Baker, 1924, 2:70-71; 郑作新, 1958, 137; Vaurie, 1959, 367-368; Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 78; 郑作新等, 1973, 151-152; Ali et Ripley, 1973, 8:260-262; 郑作新等, 1983, 212-213; Étchépar 等, 1983, 157; de Schauensee, 1984, 350; Ali et Ripley, 1987, 575-576; 郑作新, 1976, 556-558; 1987, 597-598; 西北高原生物研究所, 1989, 403-403; 王香亭等, 1990, 406.