

76. 白眉鸫 *Turdus obscurus* Gmelin(图版 IV, 图 4)

别名 宰鸡, 灰头鸫(鸟类试编)。

英文名 White-browed Thrush.

地理分布 国内分布于黑龙江省全境, 吉林长春、四平、浑江、长白山、延边(?繁殖鸟); 辽宁本溪、丹东、营口、朝阳, 北京, 天津, 河北东陵、北戴河、铁佛寺、昌黎, 河南, 山东栖霞、灵山岛, 山西沁水, 内蒙古鸟审旗、贺兰山、乌拉特旗, 甘肃弱水, 宁夏, 青海东部, 贵州江口、松桃、威宁、遵义, 绥阳、兴义、都均, 陕西, 四川成都、南充、阆中、万源、屏山、叙永、峨眉、峨边、西昌、康定, 湖北, 湖南会川, 上海, 江苏, 云南泸水、腾冲、盈江、丽江、镇康、澜沧、景东、勐海、昆明、新平、永善、蒙自、普文, 广西, 海南和台湾(旅鸟和冬候鸟)。国外见于原苏联, 蒙古, 朝鲜, 日本, 越南, 老挝, 柬埔寨, 泰国, 马来西亚, 印度, 孟加拉国及尼泊尔; 有时偶见于北美洲的阿拉斯加以及西欧等。

鉴别特征 头和颈灰褐, 眉纹白色; 上体橄榄褐; 胸和两胁橙黄色; 翼下覆羽和腋羽均灰色; 下体余部白色。

形态(依据云南普文所采的标本)

雄性成鸟: 头和颈灰褐色, 头顶沾橄榄褐; 眼先黑褐; 眉纹白色; 耳羽黑褐; 自背至上覆羽橄榄褐; 两翅与尾暗褐。颞白; 喉灰, 具少许黑色斑点; 胸与两胁橙棕色; 腹和尾下覆羽白色; 腋羽和翼下覆羽灰色。

雌性成鸟: 上体呈橄榄褐色; 颞、喉白, 均具暗褐色纵纹, 腋羽和翼下覆羽浅橙黄色沾灰。其余体羽与雄鸟相似。

虹膜褐色; 上嘴褐色、下嘴黄色; 跗蹠和爪黄绿色(♀), 或褐红色(♂)。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(10)	60 (49—65)	206 (174—223)	18 (17—20)	123 (120—131)	86 (80—90)	30 (23—33)
♀♀(10)	60 (49—69)	198 (187—215)	19 (18—20)	120 (114—125)	83 (80—86)	31 (30—34)

分类讨论 我们查看了中国科学院动物所鸟类标本馆采自内蒙古, 陕西, 天津, 北京, 河北, 上海, 山西, 福建和云南等地共计 84 只标本。发现采自内蒙古 2 只(1♂、1♀), 山西 1 只, 河北 9 只(6♂♂、3♀♀), 上海 2 只(1♂、1♀), 陕西 1 只, 共计 15 (8♂♂、7♀♀) 标本, 占查看标总数的 18.7%。它们的外观形态与上述有下列几点的不同。

雄性成鸟: 头和颈, 以及上体均呈橄榄褐色沾棕红, 而无任何灰或灰褐色; 翼上覆羽具显著的淡黄白色羽端斑, 有别于其他标本; 腋羽和翼下覆羽呈灰白、橙黄或淡橙黄沾灰色, 而非灰色。颞、喉等均呈白色, 有的还具暗褐纵纹, 尤以在喉侧更为稠密, 几乎连在一起; 具白色颞纹。

雌性成鸟: 1962 年 5 月 15 日采自云南永善的 1 只♀标本, 其翼上覆羽具淡黄白色羽端斑, 与上述和其他标本明显不同。其量衡度为, 体重 78.1 克, 全长 232、嘴峰 17.2、翅长 120、尾 80、跗蹠 31.4 毫米, 显然是个成鸟。其上体呈橄榄褐, 而非褐红色; 下体自胸至腹(包括两胁), 呈皮黄色, 而非橙黄或白色。

上述诸多个体所呈的不同羽色, 我们认为都属于个体变异, 志此以供日后研究的参考。

生态 主要栖息于海拔 2 1000 米左右的阴暗潮湿的针叶林、混交林和阔叶林, 尤其喜在水库、溪流等水域岸边富有林下的灌丛间, 非繁殖期和迁徙季节也见于林缘和灌丛地, 有时甚至进入到山区住宅附近的农田和果园。

主要取食各种鳞翅目、鞘翅目昆虫及其幼虫等, 兼吃其他小型无脊椎动物, 秋冬季节还食浆果和植物种子等。郑作新等(1973)在剖检 5 月的 2 胃, 1 胃内全为浆果, 在另 1 胃中浆果占 95% 左右, 而鳞翅目昆虫幼虫及其他昆虫碎片, 仅占 5% 左右。吴至康等(1986)剖验 5 月采得的 1 只雄鸟, 其胃内为浆果。

繁殖期在 5—7 月。吴至康等(1986)在贵州省于 5 月剖检 1 只雄鸟, 睾丸短肾形, 大小为左睾丸 3.8×3.0, 右睾丸为 3.5×3.0 毫米。傅桐生等(1984)曾于 1962 年 5 月 22 日在长白山头道白河采得到雄鸟, 睾丸很发达, 直径长为 10 毫米; 1983 年 5 月 16 日又在长白山的暗针叶林带猎获的标本, 左睾丸为 11×8.3 毫米, 右睾丸为 9.5 毫米。

营巢于林下小树的枝杈上。巢主要由植物的茎、叶和细根构成, 外壁糊以少量泥土内垫以须根和细草。巢呈杯状, 外径 12、内径 9、高 10、深 5 厘米。每窝产卵 4—6 枚, 一般为 5—6 枚。卵重 25—26 克, 大小为 24.2—27.5×19.1—20.0 毫米。

白眉鸫在东北, 每年 4 月末 5 月初迁来, 9 月末 10 月初离开, 留居期长达 6 个月, 在北京地区每年 9 月至翌年 5 月间的冬候鸟; 在台湾为 10 月至翌年 5 月的普通的冬候鸟。

Turdus obscurus Gmelin, 1789, Sys. Nat. ed. 13, 1: 816 (模式产地: 西伯利亚的贝加尔湖); Vaurie, 1959, 305; Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 10: 201—202; de Schauensee, 1984, 361; 蔡其侃, 1987, 422—424.

Turdus pallidus obscurus, Dementiev, 1954, 655; 郑作新, 1958, 163; 郑作新等, 1973, 162; 昆明动物所, 1980, 165—166; 彭燕章等, 1980, 279; 李桂垣等, 1982, 1: 127; 傅桐生等, 1984, 310—311; 吴至康等, 1986, 219; 郑作新, 1987, 638—640; 傅桐生等, 1984, 310—311; 赵正阶等, 1985, 303—304; 1988, 442—443; 诸葛阳等, 1990, 354.