

### 53. 白背矶鹑 *Monticola saxatilis* (Linnaeus)

英文名 White-backed Rock Thrush, Chestnut-tailed Rock Thrush.

**地理分布** 分布于新疆北部准噶尔盆地、西部喀什、阿克陶、天山、西南部皮山，青海东部及柴达木盆地，甘肃北部海原，宁夏，内蒙古中部乌拉特旗、伊克昭盟以及东部林西，河北北部(繁殖鸟)；偶于11月见于江苏镇江。在国外，分布于欧洲中部、南部，非洲西北隅，亚洲西南部、西部以至西伯利亚南部，蒙古；迁经印度西北部，巴基斯坦，阿拉伯，南抵非洲中部越冬。

**鉴别特征** 雄鸟上背灰蓝，下背白，下体大都锈棕色。雌鸟上体灰褐，下体皮黄色，满杂以鳞状黑斑。

**形态** (依据自新疆采得的标本)

**雄性成鸟**：头和颈的全部、背的最上部均辉蓝色；背的余部以至腰部铅蓝，背的中央白色，或多或少地沾染蓝色；较长的尾上覆羽棕栗色；中央尾羽暗褐；外侧尾羽棕栗色，外缘以些褐色；翅上的小覆羽与背同色，余羽暗褐，并除初级飞羽以外，大都具白色羽端；下体大都棕色。

**雌性成鸟**：自头至腰，包括翅上的小覆羽等均淡灰褐色，各羽微具白端和黑色次端斑；两翅余羽亦然，不过白色羽端更形明显而沾棕，次端斑的黑色亦较著；较长的尾上覆羽棕色，各羽亦杂以上述的端斑和次端斑；尾羽与雄鸟相似；下体大都白色，自胸以下均杂以黑褐色波状狭斑；尾下覆羽及腋羽均棕白。

**亚成鸟**(采自新疆8—1月间)：羽色酷似雌性成鸟，但两翅上的黑色和棕白色的斑都更显著，下体棕白，黑纹大多呈鳞状。

虹膜乌褐；嘴黑褐(♂)或稍淡(♀)；脚和趾均黑。

**量衡度**：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(4)	48—58	185—195	18—20	95—119	62—68	24—27
♀♀(4)	50—55	178—190	17—19	110—113	60—62	25—28




图 47 白背矶鹑 *Monticola saxatilis*

**生态** 在新疆，栖息在具有浓密灌丛的河漫滩草甸和多石的坡地，海拔为2000米的高度(钱燕文等,1965)。在西藏北部蓝错，我们于8月间曾见此鸟栖息于海拔4850米的高山坡地(郑作新等,1983)。据蔡其侃(1987)，此鸟栖息于山地海拔较高的地区，活动在山坡岩石间灌丛中；捕食昆虫，亦兼食野生浆果、果实及种子；繁殖期间营巢于岩石间缝隙处；每窝产卵4—5枚，由雌鸟孵卵。

*Turdus saxatilis* Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1: 294 (模式产地: 瑞典).

*Monticola saxatilis*, Baker, 1924, 177; Dementiev 等, 1954, 479—483; 郑作新, 1958, 152; Vaurie, 1959, 357; Ripley (in Mayr and Paynter), 1964, 137; 钱燕文等, 1965, 124; 郑作新, 1976, 577; 郑作新等, 1983, 221; Flint 等, 1984, 220; de Schauensee, 1984, 357; 蔡其侃, 1987, 430; 郑作新, 1987, 619; Ali and Ripley, 1987: 595; 王香亭等, 1990, 420—421.

*Monticola saxatilis turkestanicus* Зарупный, 1918, Изв. Тукест. Отд. Русск. Геогр. Общ. 14(1) 140 (天山山脉).