

22. 白腰鹊鸂 *Copsychus malabaricus* (Scopoli)

别名 溪吱喳。

英文名 White-rumped Shama.

地理分布 国内仅见于云南的西南部、南部及海南省。国外见于印度,尼泊尔,不丹,




图 19 白腰鹊鸂 *Copsychus malabaricus*
1. *C. m. interpositus* ○; 2. *C. m. minor* ●

斯里兰卡,孟加拉国,缅甸,泰国,老挝,越南,马来半岛,印度尼西亚诸岛。

鉴别特征 雄鸟上体黑色,腰和尾上覆羽白色,尾羽甚长,约为体长的一倍;颈至喉部黑色,腹部和尾下覆羽棕色。雌鸟与雄鸟十分相似,但尾较短,黑色部分为灰色替代。

形态 (依据采自云南西双版纳的标本)

雄性成鸟 从额和脸部到背、肩羽及翅上覆羽均为黑色,并具金属光泽;腰部和尾上覆羽白色;中央4枚尾羽纯黑,中央一对尾羽延伸较长,外侧尾羽基部黑色、端部白色,白色部分向外递增;飞羽褐色,三级飞羽色深近黑,初级和次级飞羽外翮外缘较淡;从颈到上胸黑色有金属光泽,下胸至尾下覆羽棕色。

雌性成鸟 羽色与雄鸟相同;但黑色部分被灰色替代,棕色部分较雄鸟浅淡;飞羽淡褐色,外翮外缘和覆羽的边缘均淡棕色;尾羽黑色,较雄鸟短很多。

虹膜褐色,嘴黑色,跗蹠和爪肉色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(10)	31.1 (26—36)	260.4 (251—279)	19.5 (18—21)	91.8 (88—95)	156.7 (139—175)	26.2 (24—29)
♀♀(5)	26—29	212—220	17—20	82—86	112—121	25—30

亚种分化 本种计有17个亚种,见于我国的仅有2个亚种。

亚种检索

- 个体较小,腰部白斑较狭窄,第4对尾羽的白色端斑较短..... 海南亚种 *Copsychus malabaricus minor* (63)
- 个体略大,腰部白斑较宽,第4对尾羽的白色端斑较长..... 云南亚种 *C. m. interpositus*(63)

(1) 云南亚种 *Copsychus malabaricus interpositus* (Robinson)

国内见于云南西南部和南部。国外见于缅甸,泰国,老挝和越南。

形态、量衡度见种的描述。

Kittacincla malabarica interposita Robinson et Kloss, 1922, Journ. Fed. Malay St. Mus. 10:262 (模式产地: 越南南部 Daban).

(2) 海南亚种 *Copsychus malabaricus minor* (Swinhoe)

仅见于我国海南省。

形态与 *C. m. interpositus* 十分相似,仅个体略小,参看表3和亚种检索。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(10)	28.3 (26—30)	232.8 (208—265)	15.2 (15—16)	86.1 (84—90)	143.7 (135—164)	26.9 (25—28)
♀♀(3)	23—27	190—196	14—15	76—81	104—119	25—27

表3

种名	性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾
<i>C. m. interpositus</i>	♂♂(10)	29—36	251—279	18—21	88—95	139—175
<i>C. m. minor</i>	♂♂(10)	26—30	208—265	15—16	84—90	135—164
<i>C. m. interpositus</i>	♀♀(5)	26—29	212—220	17—20	82—86	112—121
<i>C. m. minor</i>	♀♀(3)	23—27	190—196	14—15	76—81	104—119

Cittacincla mactura minor Swinhoe, 1870, Ibis(2)6:244(模式产地: 海南岛)。

Cittacincla Brevicauda Ogilvie-Grant, 1899, Ibis(7)5:584 (模式产地: 海南岛)。

生态 此鸟的习性与鹊鸂十分相似。栖于热带林及竹林内。鸣叫时尾直竖,鸣声清脆、悦耳,甚似鹊鸂。

据广东省昆虫研究所动物室等(1983),5月间在海南坝王岭林缘路边一棵大树上的树洞里采得一巢,树洞离地面3米,洞内垫以纤细、柔软的草根为巢,巢内2雌3卵。

白腰鹊鸂以蜻蜓、甲虫、蚂蚁等昆虫及其幼虫为食;大都不食植物;人类住所附近一般不见。

Muscicapa malabarica Scopoli, 1786, Del. Faun. ex Folr. Insubr. 2: 96 (模式产地: 印度西南部 Malabar)。

Kittacincla macroura Baker, 1924, 2: 116—120; Gee, 1948, 227.

Copsychus malabaricus 郑作新, 1958, 133; Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 69—72; Ali et Ripley, 1973, 8:244—248; 彭燕章等, 1980, 258; 广东省昆虫研究所动物室等, 1983, 216—217; de Schauensee, 1984, 348; 郑作新, 1987, 590—591.