

68. 白颈鸫 *Turdus albocinctus* Royle

英文名 White-collared Blackbird.

地理分布 国内分布于西藏樟木、亚东、波密、吉隆、察隅、排龙、春丕山谷、昌都地区西南部,四川西部康定(任国荣)。国外见于印度阿萨姆邦,尼泊尔,不丹及缅甸北部。

鉴别特征 两性相似。体形大小如家鸽。全身,除颈、项、喉等外,余均呈黑褐色。

形态(依据西藏亚东所采的标本)

雄性成鸟: 除颈、上背白色; 颈、喉等均白, 染有暗褐, 尾下覆羽具白色羽干纹; 余部均呈黑褐色。

雌性成鸟: 额、头顶及后头暗褐色, 颈部及上背灰白色沾褐; 背、腰及尾上覆羽暗棕褐色; 翅和尾羽暗褐色; 颈、喉、前胸灰白沾褐, 下体余部棕褐色。

雌性幼鸟(依据6月23日西藏波密所采的标本): 上体暗褐, 头、背、腰、翼上覆羽及尾上覆羽等均具黄棕色羽干纹; 翅黑褐。下体具棕黄色横斑。

虹膜暗褐; 嘴鲜黄, 嘴尖较暗; 脚黄至皮黄色。

量衡度 (郑作新等, 1983):

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(6)	65—95	242—265	20.0—24.5	133—145	114—120	31—33
♀♀(44)	75—106	232—275	20.0—23.0	133—146	107—127	31—35
1♀	82	232	21.0	133	107	32
1♀(幼)	69	185	16	100	52	33

生态 栖息于海拔2300—3800米的云杉林下灌丛或湖、河边灌丛间。通常成对活动, 非繁殖期有时与同种或其他鸫类混合成群。性胆怯且警惕性高。每年5—7月间通常




图 61 白颈鸫 *Turdus albocinctus*

从高大的树顶上发出甜润的歌声, 但不如乌鸫的变化大。其叫声似“tew-i, tew-u, tew-o.....”。惊叫声与其他鸫类相似, 从喉部发出“tuck, tuck, tuck.....”叫声。

以昆虫、植物果实和浆果为食。冬季和春季则以植物性食物为主。我们曾在西藏考察时剖验2个胃, 一胃内含有鳞翅目幼虫、金龟子、甲虫, 另一胃为甲虫和植物种子。

繁殖期5—7月。营巢于距地面1—3米高的结实树枝或树杈上, 巢是一个粗实而大的杯状物, 由苔藓、枯草、树根和叶构成, 内垫以枯草或树根。每窝产3—4枚卵。卵(10枚)平均大小30.5×21.7毫米(Baker, 1924)。

6月我们在西藏采得雄鸟, 其睾丸8×6毫米。雌鸟卵粒大小15×15、10×10毫米, 正值产卵盛期。7月雄性睾丸13×9毫米。

Turdus albocinctus Royle, 1839. Ill. Bot. Nat. Hist. Himalayas; ii (模式产地: 喜马拉雅山脉), nom. nud., but applied to his plate of *T. albicollis* (图版8, 图3), nec *T. albicollis* Vieillot, 1818.

Turdus albocinctus Baker, 1924, 2: 129—130; 郑作新, 1958, 160; Vaurie, 1959, 401; Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 10: 187; 郑作新等, 1983, 226—227; 郑作新; 1987, 633.