

41. 紫宽嘴鹁 *Cochoa purpurea* Hodgson

别名 紫鹁(鸟类试编)。
英文名 Purple Cochoa.

地理分布 国内见于四川中部峨眉, 贵州西部威宁, 云南西北部丽江及西南部。国外见于我南疆诸邻国。

鉴别特征 雄鸟通体淡紫色; 头顶和尾羽紫蓝色沾灰, 脸侧和颈部黑色; 飞羽淡紫色, 其羽缘及端部黑色; 尾羽具黑色端斑; 下体均为淡紫色; 雌雄羽色不同。

形态

雄性成鸟: 头顶淡紫蓝色略沾灰; 眼先、眉纹、耳羽和颈部均为黑色; 背部淡棕紫色; 两翅覆羽和次级飞羽基部为淡紫色; 初级覆羽黑色; 第1、第2枚初级飞羽黑色, 其他初级飞羽外翮基部淡紫灰色, 构成翅上淡色块斑; 次级飞羽端部黑色; 尾羽淡紫蓝色沾灰, 具黑色端斑; 下体均为淡紫, 略带淡褐色, 喉和胸部羽色较暗。

雌鸟(据 Baker, 1924; Ali 等, 1973): 体羽与雄鸟基本相似, 但雄鸟淡紫色部分, 被淡红褐色所替代; 下体淡土褐色, 与雄鸟下体淡紫色有别。

虹膜红褐色; 嘴、跖蹠及趾等暗褐色近黑。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跖蹠
♂♂(2)	85,89	240,265	18,19	135,132	107,101	27,29

紫宽嘴鹁是单型种, 至今未见有亚种分化。

生态 据 Baker (1924) 和 Ali 等(1973), 此鸟平时活动于潮湿的、常绿的、地下植物生长茂盛的密林或山谷间。性安静、胆怯而易受惊, 成对或单独活动; 觅食在地上或树枝间; 以水果、浆果、昆虫等为食。据彭燕章等(1987), 此鸟多见单个活动, 栖于常绿阔叶林内, 以昆虫为食。

Cochoa purpurea Hodgson, 1836, Journ. As. Soc. Bengal 5: 359 (模式产地: 尼泊尔); Baker, 1924, 2:184—185; Gee, 1948, 213; 郑作新, 1958, 146; Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 89; Ali et Ripley, 1973, 9:16; de Schauensee, 1984, 354; 吴至康等, 1986, 274; 郑作新, 1987, 609—610; 彭燕章等, 1987, 265—266.




图 37 宽嘴鹁属 *Cochoa*
1. *C. purpurea* O; 2. *C. viridis* ●.