

## 54. 蓝头[白喉]矶鸫 *Monticola cinclorhynchus* (Vigors)

别名 白喉石鵖(鸟类试编),臭皮翠、虎皮翠、葫芦翠(北名),小碑鵖、白喉矶鸫(南名)。

英文名 Blue-headed Rock Thrush, White-throated Rock Thrush.

**地理分布** 繁殖在内蒙古东北部呼伦贝尔盟,东北北部小兴安岭、中部长白山,河北东陵及山西东南部中条山,还可能在甘肃西南部;迁徙自繁殖地区遍及我国东部以至东南部和南部各有越冬。国外,见于西伯利亚东南部及巴基斯坦,印度,孟加拉国以至东南亚各国,偶抵马来西亚。

**鉴别特征** 雄鸟头蓝、翅黑而腹栗,各色相衬益彰。雌鸟上体大都橄榄褐色,下体呈斑杂状。雌雄的喉部中央均具白色块斑。

### 形态(依据河北省所采的标本)

雄鸟(夏羽):自额至后颈,及翅上的小覆羽等悉钴蓝色;背、两肩以及翅上的中覆羽均黑,各羽散缀以棕色狭端,尤以肩羽为然;腰和尾上覆羽浓栗色。两翅的覆余羽概黑褐色,外翈具淡灰白色狭缘;大覆羽具有白端,内侧次级飞羽的基部有一大形白斑。尾羽亦黑褐,末端黑色稍浓;中央尾羽的边缘有时更沾蓝灰色。眼先栗色,上缘以黑纹,向后直延伸至眼的上方。颊、耳羽和颈侧均黑,略杂以棕色细纹。喉的中央有一白色块斑,向前渐细,常直伸至颊;下体余部浓栗色,至腹部中央和尾下覆羽转为棕黄色;腋羽亦为棕黄或栗棕色。

雌鸟(夏羽):头顶和后颈灰褐而沾橄榄色,各羽缀以暗褐色细纹;背、肩以及翅上的小、中覆羽等概橄榄褐色,羽端并杂以黑褐色粗斑;腰和尾上覆羽污白,各羽具二条横斑。尾黑褐色。两翅余羽大都亦然,不过大覆羽、初级覆羽以及三级飞羽均狭缘以灰白色,其余飞羽的外缘也稍带锈褐色。眼周有近白的羽圈;头和颈的两侧呈棕白色,而密杂以黑褐以至栗褐色细纹。喉部中央亦具与雄鸟同形同色的块斑;喉的两侧满布着黑褐色斑纹,几乎使这部分纯呈此色,而稍杂以棕斑;下体余部棕白以至乳白色;胸和两胁密杂以圈状黑褐色羽端斑;下腹中央纯白;尾下覆羽亦白,其羽干两侧各微有纵纹,合成V字状。




图 48 蓝头矶鸫 *Monticola cinclorhynchus gularis*

幼鸟:酷似雌鸟,但上体自额至尾上覆羽均暗褐或黑褐色,而杂以棕色,在头顶成点斑状,在背部则形成横斑;两翅的内侧覆羽和飞羽均具宽阔的棕色羽缘和羽端。下体亦似雌性成鸟,不过喉部中央的白斑稍缀以黑褐色羽缘;胸以下悉具黑色羽缘,但不如成鸟的显著。雄性幼鸟的尾上覆羽转棕,翅上的小覆羽也渐变蓝。

虹膜暗褐;嘴几乎黑色,在雌鸟较淡而带褐色;脚和趾均呈肉褐色以至暗铅褐色。

### 量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(10)	34 (32—37)	约172 (168—175)	17.0 (14.4—18.9)	97.1 (93—98.8)	64.8 (60.2—69)	23.3 (21.9—24.8)
♀♀(10)	33.3 (33—34)	约172 (167—175)	16.4 (15.1—17.9)	93.9 (91—96)	63.0 (58—66)	23.5 (21.9—24.9)

**分类讨论** 此鸟原订名为 *Monticola gularis*。它与印度和巴基斯坦以及喜马拉雅山脉上的国家等所产的 *Monticola cinclorhynchus* 在体型上甚相似,在羽色上同具蓝头,翅上同具白色块斑,而且在分布上彼此互相替代,前者在东,主要在中国,后者在西,主要在印度和巴基斯坦等。因此,我们同意把上提的两种矶鸫合并为一个种,即蓝头矶鸫 *Monticola cinclorhynchus*,下隶 2 个亚种:指名亚种 *M. c. cinclorhynchus* (喉无白色块斑),产于印度一带;和白喉亚种 *M. c. gularis* (喉部中央有白色块斑),产于我国及附近地区。由此可知我国的“白喉矶鸫”,实不外是“蓝头矶鸫”的一个亚种。

**生态** 栖于多岩山地的林间,常见它站在树顶上或岩巅处,而仅露出其头部。叫声富有音韵,徐缓婉转,非常动听,在长白山一带,有人把它称为“山地歌哥”(傅桐生等,1984)。

此鸟的食物,据寿振黄(1940)5月间在青岛剖析3个鸟胃的结果,完全为昆虫,而且主要为甲虫,仅偶见蜘蛛碎片一次。郑作新等(1958)于5月间在河北昌黎剖验了6只鸟胃,亦得同样结果。此鸟所食的昆虫都是有害的种类,包括象甲、伪步行甲、蝼蛄、蝽象和鳞翅目昆虫等,以取食鞘翅目昆虫的次数较多,在6个胃中发现5次,其次为鳞翅目,剖得4次。

在长白山,繁殖于5—6月间。傅桐生等(1984)曾先后找到二巢,前一巢位于粗大的红松伐根基部的洞里;后一巢位于采伐迹地南侧林缘上崖壁的天然洞中。洞口都有草遮挡,洞口前方较空旷,甚至阳光有时可射入洞中。前者巢底和外壁均由细干松枝编织而成,内壁为红松的针叶,垫以少量草根。巢高8.0,深5.4,外径16.0,内径8.7厘米,内有6枚已在孵化后期的卵。后一巢,其外壁及巢底全为粗草茎、草叶,内壁为细草茎,垫以细草根。全窝产卵8枚,卵肉色而具清晰的点斑或块斑,钝端较密。孵化末期沾青灰色,并无任何斑点。卵重(14枚)平均为3.17(3.0—3.3)克,大小平均为22.3(20.9—24)×16.6(16.0—17.1)毫米。孵卵仅由雌鸟承担。孵化期13—14天。雏鸟孵化后,亲鸟就开始喂食,当初雌雄均参加,过几天后以雌鸟喂食为主。

*Petrocincla cinclorhynchus* Vigors, 1832, Proc. Zool. Soc. London: 172(模式产地: Mt. Himalayas).

*Monticola cinclorhynchus* Ripley (in Mayr and Paynter), 1964, 137; 郑作新, 1976, 378; Étchécopar et Hue, 1983, 184; 傅桐生等, 1984, 303; 赵正阶等, 1985, 295; 郑作新, 1987, 620; 诸葛阳等, 1990, 343.

*Oreocetes gularis* Swinhoe, 1863, Ibis: 93 (模式产地: 北京). *Monticola gularis*, Dementiev 等, 1954, 489—493; 郑作新, 1958, 152; Vaurie, 1959, 361; de Schauensee, 1984, 358; Flint 等, 1984, 220; 蔡其侃, 1987, 431.