

25. 蓝头红尾鸲 *Phoenicurus caeruleocephalus* Vigors

英文名 Blue-headed Redstart.

地理分布 见于新疆西部和中部(留鸟)。国外见于巴基斯坦西部,印度加瓦尔、大吉岭,不丹,尼泊尔,阿富汗,塔吉克东北部。

鉴别特征 雄鸟头顶和颈背浅蓝灰色,上体余部及尾黑色,飞羽暗褐色,翅上具明显的白色斑块;喉和胸黑色,腹部白色。雌鸟上体灰褐色沾绿,眼环羽色较浅,下腰和尾上覆羽栗色,翅淡褐色略沾灰,尾羽褐色较翅暗;下体浅灰色沾褐,腹部和尾下覆羽浅灰近白。




图 22 蓝头红尾鸲 *Phoenicurus caeruleocephalus*

形态

雄性成鸟(夏羽): 前额基部蓝黑色,前额、头顶向后直至颈的背面均为浅蓝灰色;飞羽暗褐色近黑,内侧大覆羽、中覆羽及内侧次级飞羽外缘白色,构成翅上明显的白色翼斑;上体余部包括尾上覆羽和尾羽均为黑色;下体从颈部到胸部亦为黑色,腹部及尾下覆羽白色。

据 Baker (1924) 和 Ali 等(1973),冬羽上体和胸部淡蓝色,羽缘棕褐色。

雌性成鸟: 头、颈和背部均灰褐色沾绿,眼环羽色浅淡;飞羽淡褐色略沾灰,大覆羽、中覆羽及三级飞羽均着以白棕色羽缘,腰部及尾上覆羽栗色;尾羽暗褐色;下体浅灰色,着以暗棕褐色的细纹;腹部和尾下覆羽浅灰近白。

虹膜暗褐色;嘴暗褐或黑色,跗蹠黑色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	16, 17	135, 140	11	78, 79	62, 65	20, 22
♀(1)	16	130	10.8	74	62	21.7

生态 习性与其他红尾鸲属鸟类相似,常觅食于灌丛间和高树枝条上,有时也降飞到地面上啄食,但很快又飞回到树枝间,并常伴以摇动尾部的动作。在繁殖季节鸣声特别动听。食物以昆虫为主。

Phoenicura caeruleocephala Vigors, 1830—31, Proc. Comm. Sci. Corr. Zool. Soc. London 1:35 (横式产地: 喜马拉雅山脉地区).

Adelura caeruleocephala Baker, 1924, 2:104—105.

Phoenicurus caeruleocephalus 郑作新, 1958, 134; 钱燕文等, 1965, 118; 郑作新, 1976, 553.

Phoenicurus caeruleocephalus Vaurie, 1959, 362; Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 10:75; Etchécopar, 1983, 151; de Schauensee, 1984, 349; Flint 等, 1984, 228; Ali et Ripley, 1987, 573; 郑作新, 1987, 177.