

4. 蓝短翅鸫 *Brachypteryx montana* Blyth

别名 白眉短翅。

英文名 Blue Shortwing.

地理分布 从西藏昌都西南部,东抵福建和台湾,北达陕西南部。在国外,自尼泊尔,印度阿萨姆邦,中南半岛以至菲律宾及印度尼西亚。

鉴别特征 雄鸟上体暗蓝色,白眉明显。

形态 (依据四川峨眉山所采的标本)

雄性成鸟: 额基、眼先及眼上方均绒黑;白色眉纹细长而明显;上体余部以及两翅和尾概呈靛蓝色,外侧飞羽稍带暗褐;下体蓝色较淡,腹羽和尾下覆羽等羽缘转灰褐色。

雌性成鸟: 上体几纯橄榄褐,头顶沾暗砖红色,尾上覆羽杂以棕色;下体淡赭褐,腹部中央更淡,近皮黄色。

虹膜赭色;嘴黑;脚与趾暗角褐。

量衡度:

采集地	性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跖蹠
西藏错那	♂(1)	21	124	12.5	67	46	31
云南贡山、碧江等	♂♂(4)	15—20	124—140	12—13	61—71	55—58	32—33
四川峨眉	♂(1)	—	142	12.5	69	58	31
西藏错那	♀♀(2)	19—24	118	12—12.5	63.5	42—49	30—31
四川峨眉	♀(1)	—	142	12.5	66	45	30




图5 蓝短翅鸫 *Brachypteryx montana*
1. *B. m. cruralis* ○; 2. *B. m. sinensis* ●; 3. *B. m. goodfellowi* ●

亚种分化 本种有 12 个亚种的分化,其中产于我国的,有 3 个亚种。

(1) 西南亚种 *Brachypteryx montana cruralis* (Blyth)

产于西藏南部错那以至昌都西南部,云南贡山、腾冲、龙川江与怒江间山脉、丽江山脉、新平、蒙自,四川中部峨眉山、瓦山、宜宾以及四川西南部(留鸟)。

形态与量衡度,详见上文。

Calliope cruralis Blyth, 1843, Journ. As. Soc. Bengal 12: 929 (模式产地: 印度 Darjeeling)。

Heieroxenicus cruralis formosier Thayer and Bangs, 1912, Mem. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll. 40: 169 (模式产地: 四川瓦山)。

Heieroxenicus cruralis laurentei La Touche, 1921, Bull. Brit. Orn. Cl. 42: 29 (模式产地: 云南蒙自)。

(2) 华南亚种 *Brachypteryx montana sinensis* Rickett and La Touche

见于贵州北部遵义娄山关(海拔 1700 米),广西,湖南,陕西南部及福建西北部。

形态 翅较 *B. m. cruralis* 为短,跖蹠也较短细;羽色较淡,眼沾灰,下体灰蓝,腹部中央近白。

量衡度:

采集地	性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跖蹠
福建挂墩	♂	—	—	10—12	65—69	49—55	26.5—28
(据 La Touche)	♀	—	—	10—12	63—66	46—50	26.5—28
贵州遵义	♀(1)	16	125	11	62.2	57	27
(据吴至康等)							

Brachypteryx sinensis Rickett and La Touche, 1897; Bull. Brit. Orn. Cl. 6: 50 (模式产地: 福建挂墩)。

(3) 台湾亚种 *Brachypteryx montana goodfellowi* Ogilvie-Grant

仅产于台湾。

形态 两性相似。羽色与 *B. m. cruralis* 的雌鸟较多橄榄褐色。据蜂须贺正氏(Hachisuka 等, 1951), 此鸟上体为橄榄褐色;初级飞羽的外缘与背同色;尾较背稍红;脸部较褐,眉纹白;下体羽色较淡,胸和腹的中央白;两胁及覆腿羽较红些;尾下覆羽红褐;嘴黑,脚和趾均褐。翅长 61—65 毫米,尾长 42—50 毫米。

Brachypteryx goodfellowi Ogilvie-Grant, 1912, Bull. Brit. Orn. Cl. 29: 108 (模式产地: 台湾阿里山)。

生态 据 La Touche (1925—30) 对 *B. m. sinensis* 的记述, 此鸟从 4 月到 11 月栖于挂墩山顶上的潮湿森林中由稠密矮竹丛集的下木间(海拔约在 2 千多米)。冬时可能下迁到较低的山谷, 但从未采集得标本。以小型昆虫为食。繁殖期中歌声十分好听, 有 6—7 音节。巢以苔藓及干叶等、织成为有圆盖的结构, 前面或旁侧有出入口, 内厚铺以苔藓的细根。巢营在满被以苔藓的树干上, 离地面约半米高。5 月初产卵卵呈椭圆形或梨圆形; 壳面平滑, 为橙色、或带粉红的黄色, 有时还杂以较浓的橙色细点; 大小为 21.5 × 16 毫米。

Brachypteryx montana Horsfield, 1822, Trans. Linn. Soc. London 13: 157 (模式产地: 印度尼西亚爪哇); Vaurie, 1959, 372; Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 16—17; 郑作新等, 1973, p. 145—146; 昆明动物研究所, 1980, 146—147; 彭燕章等 1980, 250—251; Étchécopar et Hue, 1983, 127; 郑作新等, 1983, 204—205; de Schauensee, 1984, 343; Ali et Ripley, 1987, 563; 郑作新, 1987, 574。