

28. 蓝额红尾鹩 *Phoenicurus frontalis* Vigors (图版 II, 图 6)

别名 中国蓝额鹩 (鸟类试编)。
 英文名 Chinese Blue-fronted Redstart.

地理分布 见于宁夏,甘肃西北部、西部,青海南部,湖北,四川北部、西部、西南部、中部及东部,贵州,云南西北部、西部、东南部,西藏西南部、南部、东北部(留鸟)。国外繁殖在巴基斯坦及克什米尔,向东至尼泊尔,不丹;冬季见于缅甸,越南。

鉴别特征 雄鸟额蓝,头顶、背、两肩、颈、喉、上胸等黑色沾蓝,两翅暗褐色,腰、尾上覆羽及下体余部均栗棕色,中央尾羽黑色,其余尾羽栗棕色,羽端黑色。雌鸟上体暗褐色沾棕,有明显的白眼圈,飞羽、腰部及尾羽较雄鸟略淡;下体大都暗褐沾棕,比上体淡。

形态

雄性成鸟: 额和眉纹淡辉蓝色,眼先黑色,头顶、上背、两翅的中、小覆羽、头侧、颈、喉及上胸等均黑色而有蓝辉,飞羽,大覆羽暗褐色,飞羽外羽片边缘、大覆羽端缘褐色较淡,腰、尾上覆羽及下体余部均棕色,中央尾羽黑色,外侧尾羽棕色,最外侧一对的外羽约 1/2 和羽端均黑色,其余尾羽各具较宽的黑色羽端。冬羽与夏羽相似,但头顶、背及两肩等,均镶以棕色羽端。

雌性成鸟: 额基、颈等浅棕黄色,眼圈白色,飞羽、大覆羽暗褐色,各羽具浅棕褐色的羽缘和羽端,腰、尾上覆羽、尾羽与雄鸟相似,但较雄鸟暗淡,尾羽的黑色部分略显褐色,上体余部暗褐色沾棕;头侧、喉、胸与上体同色,但较浅淡,腹部浅棕黄色,尾下覆羽淡棕色。

虹膜暗褐色;嘴、跗蹠及趾等均黑色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(10)	18.2 (16-20)	152.1 (140-162)	11.38 (10.5-12)	84.2 (82-86)	69.8 (67-75)	23.4 (22-25)
♀♀(10)	18.1 (16-20)	150.6 (142-155)	11.4 (11-12)	79.8 (78-82)	68.5 (65-72.5)	22.2 (21-23)




图 25 蓝额红尾鹩 *Phoenicurus frontalis*

生态 常成对或单个,偶尔也结集数量不等的小群,活动于高山沟谷开阔地带的山坡草地灌丛,或低山居民区附近的树丛中,常跳跃、觅食在灌丛的树枝间,或活动在孤石上、在枝间跳来跳去,偶尔在空中捕食昆虫。停息时尾羽不停地上、下摆动。食物以鳞翅目幼虫、鞘翅目及其他昆虫的幼虫等为主,兼食部分野果。

Phoenicurus frontalis Vigors, 1830-31, Proc. Comm. Sci. Corr. Zool. Soc. London 1:172 (模式产地: 印度 Garhwal).

Phoenicurus frontalis sinae Hartert, 1918, Bull. Brit. Orn, Cl, 38:78 (模式产地: 甘肃).

Phoenicurus frontalis Baker, 1924, 2:69-70; 郑作新, 1958, 136-137; Vaurie, 1959, 367; Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 10:78; 郑作新等, 1973, 151; 昆明动物研究所, 1980, 151-152; 郑作新等, 1983, 212; Étchécopar 等, 1983, 155-156; de Schauensee, 1984, 350; 吴至康等, 1986, 266; 彭瀚章等, 1987, 259; Ali et Ripley, 1987, 375; 郑作新, 1987, 596-597; 西北高原生物研究所, 1989, 403-404.