

35. 蓝额长脚地鸫 *Cinclidium frontale* Blyth

英文名 Blue-fronted Long-tailed Robin.

地理分布 国内仅见于四川石棉。国外见于印度,尼泊尔,老挝,越南等。

鉴别特征 雄鸟: 体羽深灰蓝色;前额、眉纹和两肩钴蓝色;腹部中央和尾下覆羽苍白。雌鸟体羽棕褐色;腹部中央和肛周苍白。

形态(据 Baker, 1924; 张俊范等, 1963; Ali *et* Ripley, 1973)

雄性成鸟: 额基、眼先和眼环黑色;前额、眉纹和小翼羽钴蓝色;尾羽暗褐色;胸羽具淡蓝色羽缘;腹部、两胁为褐色;腹部中央和尾下覆羽苍白;其余部分的体羽悉为深灰蓝色。

雌性成鸟: 全身羽毛棕褐色;眼环羽色浅淡;颊、喉的中央部分白色,其羽端黑色;腹部中央羽色苍淡;肛周和尾下覆羽白色。

虹膜雄鸟黑色,雌鸟暗褐色;嘴均为黑色;跗蹠、趾和爪等雄鸟黑色,雌鸟肉灰色。

量衡度(据 Baker, 1924; 张俊范等,1963):

| 性别 | 嘴峰 | 翅 | 尾 | 跗蹠 |
|----|-------|-------|-------|-------|
| ♂♂ | 14—15 | 83—93 | 75—91 | 37—39 |
| ♀♀ | 13 | 81—82 | 78 | — |

亚种分化 本种共计两个亚种: 指名亚种未见分布于我国, *C. f. orientale* 亚种国内仅见于四川石棉。

生态 只知活动在近树林的地上,无其他更多的生态资料,有待今后进一步的研究。

Cinclidium frontale Blyth, 1842, Journ. As. Soc. Bengal 11: 181 (模式产地: 印度); Ripley (*in* Mayr *et* Paynter), 1964, 10:82; Ali *et* Ripley, 1973, 9:3—4; 郑作新,1976,563.

Callene frontalis orientalis Delacour *et* Jabouille, 1930, Ois. 11:397 (模式产地: 越南北部); Baker, 1924, 2:107—108; 张俊范等,1963,动物学报,15(2): 339.




图 32 蓝大翅鸫 *Grandala coelicolor*