

1. 红喉潜鸟 *Gavia stellata* (Pontoppidan)

英文名: Red-throated Diver.

地理分布 沿海一带自黑龙江、旅顺等地南至台湾、广东等省为旅鸟或冬候鸟; 偶见于台湾北部、海南省海口。在国外, 繁殖时见于全球北极附近地区, 冬迁抵北美洲南部佛罗里达州 (Florida), 及欧、亚洲的葡萄牙、黑海、里海等处。

鉴别特征 头和颈的两侧呈铅灰色; 前颈基部具栗棕色块斑。

形态 (夏羽) 头和颈的两侧及头部下面均为铅灰色; 头和颈的上部黑而杂以白纹; 背以至尾端棕褐; 两翅表面亦然, 但肩羽和内侧覆羽微杂以白点, 均无金属光泽, 显然是尚未完全成熟的雌性成鸟; 两胁均黑而具有宽阔的白纹。前颈有一个非常明显的栗棕色块斑; 下体余部概白, 仅尾羽有些黑端。

嘴黑; 脚、趾、蹼等均暗褐色 (查看的标本很陈旧, 未能看出新鲜的颜色)。

量度 (据 Witherby 等, 1924, vol. 2, p. 475):

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (12)	38—46	276—310	42—55	67—78
♀♀—	33—44	257—308	—	—

分类讨论 本种至今尚未见有不同亚种的分化。

生态 详见科的论述。据马建章等 (1992), 本种在黑龙江下游繁殖, 详情未悉。

经济意义 在我国是一种稀有的鸟, 应予进一步的调查及相当的保护。

Colymbus stellatus Pontoppidan, 1763, Dansk Atl. 1: 621 (模式产地: 丹麦)。