

12. 金胸歌鸲 *Luscinia pectardens* (David and Oustalet) (图版 I, 图 6)

英文名 Golden-breasted Rubythroat, Firethroat, David's Orangethroat.

地理分布 陕西太白山, 四川北部茂汶、中部宝兴、西部康定、西昌, 云南西北部丽江山脉、东北部永善, 西藏昌都地区西部、东南部察隅扎拉、米林县派区(郑作新等, 1983), 西藏 Tripe, Ryikar, Tsela Dzong, Pe, Gyala, La, Chumbi Valley (Vaurie, 1972).

鉴别特征 雄性成鸟上体蓝灰色; 颞、喉至胸部均鲜棕红色, 易于识别。

形态

雄性成鸟(采自四川西昌, V1, 1944): 上体蓝灰; 颞、头和颈的两侧均黑; 颈侧的上部有一小白斑; 两翅黑褐; 尾上覆羽黑; 尾羽除中央 1 对及最外侧的二对外, 均于其基部具有显著的白斑。下体自颞至胸鲜棕红色; 胸侧黑; 腹白; 两胁及尾下覆羽暗浅黄色。

雌性成鸟(据 Ali 等, 1987): 上体橄榄褐; 喉浅赭色; 头、颈、胸等的两侧以及两胁等, 均赭褐色; 腹白而带赭色; 尾下覆羽赭色。

雄性亚成鸟: 李桂垣(四川农业大学)曾在四川宝兴县硃磬公社, 于 1963 年 7 月 18 日采得一只雄性亚成鸟。现描记形态于下面:

上体自额至腰, 包括翼上小覆羽概乌褐沾棕, 各羽具褐黑色狭缘; 尾上覆羽黑色; 两翼乌褐色, 飞羽和大覆羽的外翮缘以栗棕色; 中央尾羽黑褐色, 外侧尾羽黑褐而具白基, 最外侧一对尾羽的白色, 仅限于羽基, 愈向内白色基部愈大, 而黑褐色部分转为端斑; 眼先、颊和耳羽棕褐, 而微具棕白色轴纹; 颞、喉棕白色, 而具褐色狭缘; 胸乌褐色, 而具白色羽干纹和棕白色近端斑; 腹和尾下覆羽白, 而微具褐色狭缘; 腋羽橙黄色; 两胁暗灰色, 而具棕端。

量衡度:

采集地	采集日期	性别	全长	体重	嘴峰	翅	尾	跗蹠
四川西昌	V.1.1944	♂(1)	150	—	16	72	56	28
四川天全	V.6.1991	♂(1)	131	15	11.7	72	68.6	29
四川宝兴 硃磬公社	V.7.1983	♂(1)	127	16	11.7	68	56	29
同上	VII.18, 1963	♂亚成鸟(1)	130	20	11.5	68	57	29

分类讨论 许多作者认为这一种歌鸲是有两种色型的: 一为金胸型, 另一为黑喉型。近来还有些人却认为这两个色型是两个独立的种(详情见后一种的分类讨论)。




图 12 金胸歌鸲 *Luscinia pectardens*

生态 此鸟非常罕见。栖于山林中或沟谷底处稠密的灌丛间。

Calliope pectardens David et Oustalet, 1877, Ois Chine: 236 (模式产地: 四川宝兴).
Calliope Davidi Oustalet, 1898, Bull. Mus. Hist. Nat. 4:222 (模式产地: 四川康定).
Luscinia davidi gloriosa Sushkin 1926, Auk 43: 181 (模式产地: 云南丽江山脉).
Luscinia pectardens 郑作新, 1938, 129; Vaurie, 1959, 385—6; 郑作新等, 1973, 147—8; 彭燕章等, 1980, 253; 郑作新等, 1983, 208; 郑作新, 1987, 582.
Erishacus pectardens Ripley (in Mayr and Paynter), 1964, 46; Étchécopar et Hue, 1983, 139; de Schauensee, 1984, 345; 567—568.