

## 2. 锈腹短翅鸫 *Brachypteryx hyperythra* Jerdon and Blyth

英文名 Rusty-bellied Shortwing.

**地理分布** 仅见于云南贡山冯库, 海拔 1 800—1 900 米。在国外, 分布于印度北部的大吉岭及阿萨姆邦, 锡金。

**鉴别特征** 雄鸟上体深蓝, 下体大都锈黄色。

**形态** (据昆明动物研究所鸟类组, 1980)

雄性成鸟: 眼先及眼圈绒黑, 具短而宽的白色眉纹, 常被额羽掩盖; 头侧、头颈两侧以及上体和翼上覆羽呈深蓝色, 颊及耳羽黑蓝; 两翅褐色, 初级飞羽外翈较淡; 尾羽黑褐; 自颊至上腹及尾下覆羽亮锈黄色, 胸和两胁浓暗, 喉及腹中央浅淡, 呈棕白色。

雌性成鸟: 整个上体橄榄褐色; 眉纹不显著; 眼先及耳羽的轴纹淡色; 颊、喉、胸及两胁锈黄, 并沾褐色; 腹中央及肛周近白; 两翅及尾羽褐色, 外缘沾棕。

虹膜黑褐色; 嘴黑; 脚暗褐(雄鸟)或淡褐色(雌鸟)。

据 Ali 等 (1983), 此鸟下体在雄鸟全为铁锈 (ferruginous) 色, 在雌鸟则较浅淡, 腹部中央近白。de Schauensee (1984) 却以此鸟下体为赭色 (ochraceous), 雌淡赭, 腹部中央近白。

**量衡度** (据昆明动物研究鸟类组, 1980):

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	15	115	12	64	43	27
♀(1)	15	120	12	64	42	28

**生态** 两脚显然很长, 适于地栖。见于以栎树为主的常绿阔叶林。喜单独在密林下木、灌木丛或竹丛间活动。鸣声悦耳。5月23日采的雄鸟, 翼丸膨大, 约为 4×7 毫米 (据昆明动物研究所鸟类组, 1980)。

*Brachypteryx hyperthrus* Jerdon et Blyth, 1861, Proc. Zool. Soc. London: 201 (模式产地: 印度 Darjeeling); Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, p. 15; 昆明动物研究所, 1980, p. 145—146; 彭燕章等, 1980, 249—250; de Schauensee, 1984, p. 343; Ali et Ripley, 1987, 562; 郑作新, 1987, 573.

*Heteroxenus hyperthrus* Baker, 1924, 17.

1) 量度以毫米计, 衡度以克计, 下同。